

Hémiptères Homoptères d'A. O. F.

par V. LALLEMAND et H. SYNAVE.

Famille : FULGORIDAE.

Rhinorta cincta FABRICIUS.

FABRICIUS, J. C., 1803, *Syst. Rhyng.*, p. 90.
1 ex. : Pastoria, 22-V-1951.

Famille : CIXIIDAE.

Oliarus moestus f. **virgultivagus** HESSE.

HESSE, A. J., 1925, *Ann. South. Afr. Mus.*, vol. 23, p. 151,
pl. VII, fig. 4.
1 ex. : région Kindia, Damakanya, 2-V-1951, Exp. Mus. Frey.

Oliarus sp.

Il s'agit probablement d'une espèce nouvelle que nous ne décri-
vons pas, ne possédant qu'un exemplaire ♀.
1 ex. : région Kindia, Mont Gangan, 750 m., 3-V-1951, Exp.
Mus. Frey.

Famille DICTYOPHORIDAE.

Raphiophora vitrea SCHAUM.

SCHAUM, H. R., 1850, in *Ersch. und Grub. Enc.*, p. 67, *Nemato-
phora*.
1 ex. : N'Zérékoré, 7-VII-1951, Exp. Mus. Frey.

Paranagnia afra STÅL.

STÅL, C., *Hem. Afric.*, vol. 4, p. 158 (*Anagnia*).
 2 ex. : Ouest du lac Rhiz, Mauritanie, 8-X-1952, Dekeyser ;
 Soudan fr., 1951, Exp. Mus. Frey.

Aluntia schimperii GUÉRIN.

GUÉRIN, F. E., 1849, in *Lej. Voy. en Abyss., Ins.*, p. 343, pl. 6,
 fig. 7 (*Fulgora*).
 1 ex. : région Kindia, Mont Gangan, 750 m., 3-V-1951, Exp.
 Mus. Frey.

Philotheria senegalensis SPINOLA.

SPINOLA, M., 1839, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, vol. VIII, p. 295 (*Dictyophora*).
 5 ex. : Bamako, Soudan Fr., IX-1952, Mougin ; Dakar, Sénégal,
 29-VII-1952 (à la lampe.) A. Villiers ; Kindia, 9-V-1951, Exp.
 Mus. Frey.

Dictyophora validirostris STÅL.

STÅL, C., 1866, *Hem. Afric.*, vol. 4, p. 155.
 2 ex. : région Kindia, Damakanya, 12-V-1951, Exp. Mus. Frey ;
 région Kindia, Mont Gangan, 500 m., 6-V-1951, Exp. Mus. Frey.

Dictyophora proxima MELICHAIR.

PUTON, A., 1887, *Rev. d'Ent.*, XI, p. 30, *Dictyophora unicolor*
 var. *pittata*. — MÉLICHAR, L., 1912, *Abh. K. K. Zool. Bot. Ges.
 Wien* Bd VII, H. I, p. 134.
 1 ex. : rég. Kindia, Mont Gangan, 550 m., 16-V-1951, Exp. Mus.
 Frey.

Dictyophora elliptica WALKER.

WALKER, F., 1851, *List. Hom. Ins.*, vol. 2, p. 312.
 1 ex. : Damakanya, 29-30-IV-1951, Exp. Mus. Frey.

Dictyophora sp.

1 ex. : Chari, entre Fort Lamy et Lac Tchad, A. E. F., VIII-
 1948, Mission P. Lebeu.

Nersia serena STÅL.

STÅL, C., 1866, *Hem. Afric.*, vol. 4, p. 158 (*Dictyophora*).

1 ex. : rég. Kindia, Mont Gangan, 700 m., 26-V-1951, Exp. Mus. Frey ; Fouta Djallon, Dalaba, 200 m., 22-VI-1951, Exp. Mus. Frey.

Nersia paupera MÉLICHAR.

MÉLICHAR, L., 1912, *Abh. K. K., Zool. Bot. Ges. Wien*, Bd VII, H. I, p. 138.

1 ex. : Fouta Djallon, Dalaba, 1.200 m., 22-VI-1951, Exp., Mus. Frey.

Famille : FLATIDAE.

Ityraea rubescens sp. n.

Front à bords latéraux relevés et carénés, légèrement rétréci vers la base, sans carène. Vertex assez large à la base, à bords latéraux relevés et tranchants, légèrement rétréci vers l'avant,




FIG. 1. — *Ityraea rubescens*, n. sp., édéage.

où il prolonge directement le front. 2^e article des antennes à peu près 5 fois aussi long que le 1^{er}, à faces latérales aplaties, la face externe présentant un large sillon net sur la moitié basale. Pronotum tricaréné, à bord antérieur médialement échancré. Scutellum fortement bombé vers l'avant. Élytres à membrane cos-

tale nettement plus étroite que la cellule costale. Tête, 1er article des antennes, pronotum, scutellum et pattes, ocre brun clair. Élytres ocre brun clair avec une étroite bordure noire depuis le milieu du bord costal jusqu'à l'apex du clavus. Ailes rouge vif (visibles par transparence et donnant une teinte rougeâtre aux élytres). Tarses brun noir.

Genitalia ♂, voir fig. 1. Longueur totale : ♂, 21 mm. ; ♀, 26 mm.

Type : 1 ♂, Fouta Djallon, Dalaba, 1.200 m., 9-VI-1951, Exp. Mus. Frey. 1 paratype ♀, même localité.

***Flatina liciata* MELICHAR.**

MÉLICHAR, L., 1901, *Ann. Naturh. Mus. Wien*, vol. 16, p. 215, pl. 2, fig. 7.

3 ex. : N'Zézékoré, 9-VII-1951, Exp. Mus. Frey ; rég. Kindia, Dama-kanya, 26-27-IV-1951.

***Flatina liciata dalabensis* ssp. n.**

Se distingue de l'espèce par l'absence des 4 lignes obliques rouges sur les élytres. Des 5 exemplaires examinés, 2 n'ont pas les carènes latérales du pronotum rouges, tandis que les 3 autres




FIG. 2. — *Flatina liciata* MÉLICHAR, édéage.

les ont. Aucun des spécimens n'a le bord latéral du scutellum et la pointe rouge, comme c'est le cas pour l'espèce. Les genitalia ♂ sont identiques à ceux de *liciata* MÉLICHAR (voir fig. 2).
Longueur : de 16 à 18 mm.

Type : 1 ♂, Fouta Djallon, Dalaba, 1.200 m., 26-VI-1951, Exp. Mus. Frey. 4 paratypes : même localité.

Cryptoflata unipunctata OLIVIER.

OLIVIER, G. A., 1791, *Encycl. Méthod.*, vol. 6, p. 576 (*Fulgora*).
6 ex. : région Kindia, Mont Gangan, 500 m., 5-V-1951, Exp. Mus. Frey ; M'Bao, près de Dakar, Sénégal, 27-VI-1952, A. Villiers ; Dakar, 29-VII-1952 (à lampe,) A. Villiers ; Bamako, 20-VII-1951, Exp. Mus. Frey.

Famille : ACANALONIIDAE.

Parathiscia conjugata MÉLICHAR.

MÉLICHAR, L., 1901, *Ann. Naturh. Hofmus. Wien*, vol. 16, p. 194, pl. I, fig. 3, 3 a.

3 ex. : rég. Kindia 10-V-1951, Exp. Mus. Frey ; Fouta Djallon, Dalaba, 1.200 m., 13-14-VI-1951, Exp. Mus. Frey.

FAMILLE : RICANIIDAE.

Pochazia fasciata FABRICIUS.

FABRICIUS, J. C., 1803, *Syst. Rhyng.*, p. 47.

1 ex. : N'Zérékoré, 9-VII-1951, Exp. Mus. Frey.

Ricanopsis semihyalina MÉLICHAR.

MÉLICHAR, L., 1898, *Ann. Naturh. Hofmus. Wien*, vol. 13, p. 252, pl. 10, fig. 3.

5 ex. : Fouta Djallon, Dalaba, 1.200 m., 22-VI-1951, Exp. Mus. Frey ; rég. Kindia, Damakanya, 29-30-IV-1951, Exp. Mus. Frey ; région Kindia, Mont Gangan, 550 m., 1-VI-1951, Exp. Mus. Frey.

Famille ISSIDAE.

Trienopa paradoxa GERSTAECKER.

GERSTAECKER, C. E. A., 1891, *Jahrb. Ber. Hamb. Anst.*, IX, 2 Hälfte, p. 58, 96.

4 ex. : région de Ditine, 25-IV-1951, Exp. Mus. Frey ; rég. Coyah, Cercle de Dubréka, 20-21-VI-1951 ; Kassa Isl., 19-IV-1951, Exp. Mus. Frey ; Conakry, 17-IV-1951, Exp. Mus. G. Frey.

Heinsenina sp. ?

4 ex. : rég. Coyah, Cercle de Dubréka, 20-21-IV-1951, Exp. Mus. Frey ; rég. Kindia, Damakanya, 12-V-1951, Exp. Mus. Frey ; rég. Kindia, Mont Gangan, 900 m., 8-V-1951, Exp. Mus. Frey.

Famille : CICADIDAE.

Platypleura clara AMYOT et SERVILLE.

AMYOT, C. J. B. et SERVILLE, J. G. A., 1843, *Hist. Ném.*, p. 469 (*Oxypleura*).

1 ex. : Dakar, Sénégal, 19-VIII-1952 (à la lumière), M. Condamin.

Ugada limbata FABRICIUS.

FABRICIUS, J. C., 1775, *Syst. Ent.*, p. 678, 3.

1 ex. : Adiopodoumé, Côte d'Ivoire, XII-1952, M. Giovannetti.

Trismarcha fuliginosa KARSCH.

KARSCH, F. A. F., 1891, *Ent. Nachr.*, vol. 17, p. 350.

4 ex. : Kribi, Cameroun, R. P. J. M. Carret ; Région Kindia, Mont Gangan, 800 m., 20-V-1951 ; Exp. Mus. Frey ; Pastoria, 22-V-1951, Exp. Mus. Frey ; région Kindia, Damakanya, 29-30-IV-1951, Exp. Mus. Frey.

Abroma sp. ?

6 ex. : Kankan, 1-VII-1951, Exp. Mus. Frey ; Fouta Djallon, Dalaba, 1.200 m., 8-VI-1951, Exp. Mus. Frey.

Famille : CERCOPIIDAE.

Locris erythromela WALKER.

WALKER, F., 1858, *Insect. Saunders.*, Hom., p. 87 (*Monecphora*).

4 ex. : rég. Kindia, Damakanya, 26-27-IV-1951 ; Kankan, 2-VII-1951.

Locris maculata FABRICIUS.

FABRICIUS, J. C., 1794, *Ent. Syst.*, vol. 4, p. 48 (*Cercopis*).

6 ex. : rég. Kindia, Damakanya, 29-30-IV-1951 ; Pastoria, 22-V-1951 ; Mont Gangan, 600 m., 10-V-1951 ; Seguenia, 10-V-1951.

Locris meurissei LALLEMAND.

LALLEMAND, V., 1949 *Mém. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg.*, 2^e sér., fasc. 32 p. 137.

2 ex. : Fouta Djallon, Dalaba, 1.200 m., 7-VI-1951 ; 13-14-VI-1951.

Locris pullata STÅL.

STÅL, C., 1866, *Hem. Afric.*, vol. 4, p. 63.

8 ex. : Fouta Djallon, Dalaba, 1.200 m., 7-VI-1951.

Locris quadrinotata LALLEMAND.

LALLEMAND, V., 1923, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, sér. 9, vol. XI, p. 233.

1 ex. : N'Zérékoré, 8-VII-1951.

Locris rubra Fabricius ⁽¹⁾

FABRICIUS, J. C., 1794, *Ent. Syst.*, vol. 4, p. 48 (*Cercopis*).

1 ex. : Bamako, 20-VII-1951.

Locris rubra flava LALLEMAND.

LALLEMAND, V., 1929, *Rev. Zool. Bot. Afric.*, vol. XVII, p. 215.

1 ex. : Kankan, 2-VII-1951, Exp. Mus. G. Frey.

Locris rubra nyangweana LALLEMAND.

LALLEMAND, V., 1949, *Mém. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg.*, sér. 2, fasc. 32, p. 148.

1 ex. : Molodo, Soudan Fr., 10-IX-1952, T. Lèye.

(1) Depuis la parution du premier volume de « Révision des *Cercopinae* » le D^r Lallemand a pu se procurer un ♂ de *Locris rubra*. Nous avons pu constater en étudiant ses génitalia, que cette espèce varie tout autant que beaucoup d'espèces africaines telles par exemple : *Ptyelus grossus* et *P. flavescens* FABRICIUS, *P. goudoti* BEUN, *Sepullia murrayi* SIGNORET et que sa nomenclature devait être modifiée.

Locris rubra rubens ERICHSON.

ERICHSON, W. F., 1842, *Preisverz. v. v. Doubl.*, p. 12.
1 ex. : rég. Kindia, Mont Gangan, 500 m., 8-V-1951.

Locris villiersi n. sp.

Tête, pronotum, écusson, pro et mésosternum, pattes et abdomen, noirs ; métasternum ocre brunâtre. Élytres ocre un peu rougeâtre, à partie apicale noire, bord antérieur de cette région concave. Ailes hyalines, à extrémité enfumée. Postclypeus montrant une forte carène médiane longitudinale très saillante ; sur les côtés, il montre de légers sillons transversaux ; vu de face, il est globuleux et, vu de côté, arrondi. La partie supérieure de la tête est un peu plus courte que large entre les yeux ; son bord antérieur est en angle obtus. Pronotum légèrement rugueux, grossièrement ponctué, avec carène mousse, peu marquée. Sur les élytres le réseau apical est dense.

Longueur : 10 mm.

Type : ♂, savane de Yentedou (Massif du Simandou, Guinée française), IX-1951, M. Lamotte. Paratypes : 3 ♂ et ♀ de même provenance.

Hemitricphora xanthospila bimaculata LALLEMAND.

LALLEMAND, V., 1920, *Rev. Zool. Afric.*, vol. VII, p. 280 (*Tomaspis*).

1 ex. : N°Zérékoré, 5-VII-1951.

Genre **Paramonecphora** nov.

Postclypeus bombé ou globuleux, à carène médiane longitudinale plus ou moins forte, pouvant être mousse et n'occuper que la moitié supérieure, comme chez *Monteironis* DISTANT ; elle est beaucoup moins marquée chez les ♀♀, chez qui elle peut presque disparaître ; front séparé du postclypeus par une fine carène transversale ; ocelles plus près l'un de l'autre que des yeux ; pronotum plus ou moins fortement ponctué et strié, sans carène nette, il est échancré à son bord postérieur ; sur le tiers basal de la corie, les nervures médiane et cubitale sont soudées sur un trajet de longueur variable ; une ou deux épines sur les tibias pos-

térieurs ; lames latérales des ♂♂ étroites, droites ou seulement légèrement incurvées vers leur extrémité, elles sont appliquées contre l'extrémité de l'abdomen.

Font partie de ce genre les espèces suivantes : *binotata* DISTANT, *homochroma* KARSCH., *kapiriensis* LALLEMAND, *karschi* DISTANT, *modesta* DISTANT, *monteironis* DISTANT, *subsanguinea* HAUPT, *daltoni* DISTANT, *johannae* DISTANT, *nigra* LALLEMAND.

GÉNOTYPE : *Tomaspis monteironis* DISTANT.

AIRE DE DISPERSION : Afrique intertropicale.

***Paramonecphora binotata* DISTANT.**

DISTANT, W. L., 1878, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, vol. 2, p. 177 (*Tomaspis*).

1 ex. : Kribi, Cameroun, 1952, R. P. J. M. Carret.

***Sepullia murrayi viridicollis* MÉLICHAR.**

MÉLICHAR, L., 1905, *Wien. Ent. Zeit.*, vol. 24, p. 29 (*Hemiapterus*).

2 ex. : rég. Kindia, Mont Gangan, 900 m., 8-V-1951.

***Poophilus conspersus* STÅL.**

STÅL, C., 1866, *Hem. Afric.*, vol. 4, p. 73.

2 ex. : Molodo, Soudan Fr., 10-IX-1952, T. Lège ; forêt de Bandia, Sénégal, 26-VIII-1952, A. Villiers.

***Poophilus costalis* WALKER.**

WALKER, F., 1851, *List. Hom. Ins.*, vol. 3, p. 707 (*Ptyelus*).

11 ex. : rég. Coyah, Cercle de Dubréka, 20-21-IV-1951 ; Fouta Djallon, Dalaba, 1.200 m., 23-VI-1951 ; rég. Kindia, Damakanya, 26-27-IV-1951 ; rég. Kindia, Mont Gangan, 500 m., 5-V-1951 ; Kankan, 2-VII-1951.

***Ptyelus flavescens* FABRICIUS.**

FABRICIUS, J. C., 1794, *Ent. Syst.*, vol. 4, p. 24 (*Tettigonia*).

6 ex. : N'Zérékoré, 6-VII-1951.

Ptyelus grossus FABRICIUS.

FABRICIUS, J. C., 1794, *Ent. Syst.*, vol. 4, p. 47 (*Cercopis*).
7 ex. : Fouta Djallon, Dalaba, 1.200 m., 22-VI-1951 ; région Kindia, Mont Gangan, 900 m., 8-V-1951 ; Kindia, 11-V-1951 ; rég. Kindia, Damakanya, 12-V-1951 ; N'Zérékoré, 5-VII-1951.

Clovia apicata HAGLUND.

HAGLUND, C. J. E., 1899, *Öfv. K. Vet. Akad. Förh.*, vol. 54, p. 53.
1 ex. : Mamou, 29-VI-1951.

Clovia bigoti SIGNORET.

SIGNORET, C., 1858, in *Thoms. Arch. Ent.*, vol. 2, p. 331, pl. 2, fig. 10 (*Ptyelus*).
1 ex. : Fouta Djallon, Dalaba, 1.200 m., 24-VI-1951.

Clovia callifera STÅL.

STÅL, C., 1856, *Öfv. K. Vet. Akad. Förh.*, vol. 13, p. 199 (*Ptyelus*).
1 ex. : Kankan, 2-VII-1951.

Clovia minuta LALLEMAND.

LALLEMAND, V., 1920, *Rev. Zool. Afr.*, vol. VIII, fasc. 2, p. 167.
1 ex. : Kankan, 1-VII-1951.

Neolepyroniella apicata SCHMIDT.

SCHMIDT, E., 1924, *Ent. Mitteil.*, vol. XIII, p. 97 (*Lepyronia*).
8 ex. : Fouta Djallon, Dalaba, 1.200 m., 15-VI-1951.
