

# Contribution à l'étude de la faune de la Basse-Casamance (Sénégal)

## XVIII. Homoptères

par H. SYNAVE.

---

L'Institut Fondamental d'Afrique Noire a bien voulu me confier, pour étude, le matériel recueilli en Basse-Casamance. L'intérêt de ces récoltes réside dans le fait que les Homoptères de cette région n'ont, jusqu'à présent, fait l'objet d'aucune étude et que, de plus, la Basse-Casamance, région sud-ouest du Sénégal, présente l'intérêt biogéographique d'être l'extrême prolongement vers l'Ouest de la zone préforestière guinéenne.

### FAMILLE *CICADIDAE*.

#### Genre *UGADA* DISTANT.

DISTANT, W. L., 1904, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (7), XIV, p. 299.

#### *Ugada limbata* (FABRICIUS).

*Tettigonia limbata* FABRICIUS, J. C., 1775, *Syst. Ent.*, p. 678.

12 ex. : Forêt classée de Santiaba-Mandjak, 16-X-1962 (à la lumière); forêt classée de Tobor, 11-XI-61 (à la lumière); 17-XI-61. Afrique occidentale et centrale.

FAMILLE *CERCOPIIDAE*.Genre **PTYELUS** LEPELETIER et SERVILLE.

LEPELETIER, A. L. M. et SERVILLE, J. G. A., 1825, *Encycl. Méthod.*, vol. 10, p. 608.

**Ptyelus grossus** (FABRICIUS).

*Cercopis grossus* FABRICIUS, J. C., 1794, *Ent. Syst.*, vol. 4, p. 47.

1 ex. : Forêt classée de Santiaba-Mandjak, 23-XI-61 (bord de route).

Genre **POOPHILUS** STÅL.

STÅL, C., 1866, *Hem. Afric.*, vol. IV, p. 72.

**Poophilus costalis** (WALKER).

*Ptyelus costalis* WALKER, F., 1851, *List Hom. Ins. Brit. Mus.*, vol. 3, p. 707.

188 ex. : Tabi, près Bignona, 14-XI-1961, bord de route, herbes basses ; forêt de Djibelor, 20-XI-61 ; forêt classée de Tobor, 21-XI-61 ; Santiaba Mandjak, 18-X-63, fauchage prairie à palmiers ; forêt classée de Bignona, 16-XI-61 ; forêt de Boutolate, 19-XI-61 ; forêt classée des Kalounayes, 26-XI-61 ; Oussouye, 17-X-62, à la lumière.

Espèce répandue dans toute l'Afrique intertropicale forestière.

**Poophilus grisescens** (SCHAUM).

*Aphrophora grisescens* SCHAUM, H. R., 1853, *Ber. Akad. Wiss. Berl.*, p. 359.

4 ex. : Forêt classée de Bignona, 19-XI-61, 14-XI-61.  
Afrique intertropicale.

Genre **CLOVIA** STÅL.

STÅL, C., 1866, *Hem. Afric.*, vol. IV, p. 75.

**Clovia pseudoprolixa** LALLEMAND.

LALLEMAND, V., 1920, *Rev. Zool. Afr.*, vol. 7, fasc. 3, p. 260.

20 ex. : Tabi, près de Bignona, 13-XI-61, dans cultures ; 14-XI-61, bord de route, herbes basses ; Emaye, 15-X-62, fauchage palmeraie.

Espèce connue du Congo (Leo) et de Guinée.

Genre **SEPULLIA** STÅL.

STÅL, C., 1866, *Hem. Afric.*, IV, p. 79.

**Sepullia murrayi** (SIGNORET).

*Clastoptera murrayi* SIGNORET, V., 1858, THOMSON, *Arch. Ent.*, vol. 2, p. 333.

1 ex. : Tabi, près de Bignona, 14-XI-61, bord de route, sur herbes basses.

Afrique intertropicale.

Genre **LOCRIIS** STÅL.

STÅL, C., 1866, *Hem. Afric.*, IV, p. 56.

**Locris rubens** (ERICHSON).

*Cercopis rubens* ERICHSON, W. F., 1842, *Preizverz. v. v. Doubl.*, p. 12.

46 ex. : Forêt classée des Kalounayes, 26-XI-61 ; Tabi, près de Bignona, 17-XI-61, dans cultures.

Afrique occidentale et centrale.

FAMILLE *DERBIDAE*.Genre **ZORAIDA** KIRKALDY.

KIRKALDY, G. W., 1900, *The Entom.*, **33**, p. 242.

**Zoraida ugandensis** DISTANT.

DISTANT, W. L., 1914, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (8), 13 ; p. 416.

1 ex. : Forêt classée de Tobor, 11-XI-61, à la lumière.  
Uganda, Sierra Leone, Congo (Brazzaville).

**Zoraida fulgipennis** MUIR.

MUIR, F., 1928, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (10), I, p. 520, fig. 30, 31.

1 ex. : Tabi, près de Bignona, 14-XI-61.  
Sierra Leone.

FAMILLE *DICTYOPHARIDAE*.Genre **RAPHIOPHORA** SCHAUM.

SCHAUM, H. R., 1850, *Allgem. Enc. Ersch und Gruber*, 51, p. 67 (*Nematophora*)  
1851, *Arch. Nat.*, 17, p. 268 (*Raphiophora*).

**Raphiophora zephyra** (GERSTAECKER).

*Simotettix zephyra* GERSTAECKER, C. E. A., 1895, *Mitt. Naturw. Ver. Greifswald*,  
27, p. 14.

9 ex. : Tabi, près de Bignona, 17-XI-61, lisière de forêt ; forêt  
classée de Tobor, 13-XI-61, piège UV.

Afrique occidentale, Congo (Léo).

Genre **PARANAGNIA** MÉLICHAR.

MÉLICHAR, L., 1912, *Abh. Zool. Bot. Ges. Wien*, 7 (1), p. 54.

**Paranagnia afra** STÅL.

STÅL, C., 1866, *Hem. Afric.*, 4, p. 159.

3 ex. : Tabi, près de Bignona, 14-15-XI-61, à la lumière.

Afrique occidentale.

Genre **AFRONERSIA** FENNAH.

FENNAH, R. G., 1957, *Ann. Mus. Roy. Congo belge*, sér. 8, vol. 59, p. 65.

**Afronersia dionaea** FENNAH.

FENNAH, R. G., 1957, *Ann. Mus. Roy. Congo belge*, sér. 8, vol. 59, p. 65,  
fig. 40 a-f.

1 ex. : Tabi, près de Bignona, 12-XI-61, à la lumière.

Espèce décrite du Congo (Léo).

**Afronersia coronis** FENNAH.

FENNAH, R. G., 1957, *Ann. Mus. Roy. Congo belge*, sér. 8, vol. 59, p. 77,  
fig. 48 a-e.

4 ex. : Tabi, près de Bignona, 12-XI-61, à la lumière.

Espèce décrite du Congo (Léo).

**Afronersia junix** FENNAH.

FENNAH, R. G., 1957, *Ann. Mus. Roy. Congo belge*, sér. 8, vol. 59, p. 70, fig. 43 a-e.

1 ex. : Tabi, près de Bignona, 14-15-XI-61, à la lumière.  
Espèce décrite du Congo (Leo).

Genre **PHILOTHERIA** MÉLICHAR.

MÉLICHAR, L., 1912, *Abh. Zool. Bot. Ges. Wien*, 7, (I), p. 92.

**Philotheria senegalensis** (SPINOLA).

*Dictyophora senegalensis* SPINOLA, M., 1839, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 8, p. 295.

14 ex. : Tabi, près de Bignona, 12-XI-61, à la lumière ; lisière de la forêt de Bignona, 17-XI-61.

Sénégal, Angola, Guinée portugaise.

**Philotheria choraules** FENNAH.

FENNAH, R. G., 1958, *Bull. IFAN.*, t. XX, 2, p. 515, fig. 20 : I-3.

1 ex. : Forêt classée de Tobor, 13-XI-61, à la lampe UV.  
Espèce décrite du Sénégal.

**Philotheria ceto** FENNAH.

FENNAH, R. G., 1957, *Ann. Mus. Royal Congo belge*, vol. 59, p. 62, fig. 37 a-e.

3 ex. : Forêt classée de Tobor, 13-XI-61, à la lampe UV ; Tabi, près de Bignona, 18-XI-61, lisière de forêt.

Espèce décrite du Congo (Léo).

**Philotheria decellei** SYNAVE.

SYNAVE, H., 1955, *Rev. Zool. Bot. Afr.*, LXXI, 1-2, p. 3, fig. 5-10.

4 ex. : Tabi, près de Bignona, 13-XI-61, à la lumière ; forêt classée de Tobor, 13-XI-61, piège UV.

Espèce décrite de Côte d'Ivoire.

Genre **NEODICTYA** SYNAVE.

SYNAVE, H., 1965, *Expl. Parc Nat. Garamba*, fasc. 47, p. 37.

**Neodictya izzardi** SYNAVE ?

SYNAVE, H., 1965, *Rev. Zool. Bot. Afr.*, LXXI, 1-2, p. 37, fig. 86, 89, 100.

1 ex. : Forêt classée de Tobor, 13-XI-61, piège UV (♀).

FAMILLE *FULGORIDAE*.Genre **DRUENTIA** STÅL.

STÅL, C., 1866, *Hem. Afric.*, IV, p. 144.

**Druentia variegata** STÅL.

STÅL, C., 1866, *Hem. Afric.*, IV, p. 144.

2 ex. : Forêt classée de Tobor, 15-16-XI-61 ; Tabi, près de Bignona, 14-XI-61, bord de route, sur herbes basses.  
Sénégal, Congo (Léo).

Genre **OMALOCEPHALA** SPINOLA.

SPINOLA, M., 1839, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, vol. 8, p. 259.

**Omalocephala cincta** (FABRICIUS).

*Cercopis cinctus* FABRICIUS, J. C., 1803, *Syst. Rhyng.*, p. 90.

1 ex. : Forêt classée de Tobor, 15-16-XI-61.  
Guinée, Sénégal, Sierra Leone, Dahomey.

FAMILLE *TROPIDUCHIDAE*.Genre **NUMICIA** STÅL.

STÅL, C., 1866, *Hem. Afric.*, IV, p. 190.

**Numicia lotis** FENNAH.

FENNAH, R. G., 1957, *Ann. Mus. Roy. Congo belge*, vol. 59, p. 132, fig. 81 a e.

1 ex. : Forêt classée de Tobor, 11-XI-61, à la lumière.  
Espèce décrite du Congo (Léo).

Genre **CATULLIARIA** MUIR.

MUIR, F., 1931, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (10), 7, 40, p. 300.

**Catullaria njalae** MUIR.

MUIR, F., 1931, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (10), 7, 40, p. 300, fig. 3.

1 ex. : Tabi, près de Bignona, 14-XI-61, lisière de forêt.  
Sierra Leone, Congo (Léo).

FAMILLE *RICANIDAE*.Genre **POCHAZIA** AMYOT et SERVILLE.

AMYOT, C. J. B. et SERVILLE, J. G. A., 1843, Hist. Nat. Hémipt., p. 528.

**Pochazia fasciata** f. **divisa** MÉLICHAR.

MÉLICHAR, L., 1898, *Ann. K. K. Naturhist. Hofmus.*, Bd XIII, p. 208.

1 ex. : Forêt classée de Santiaba-Mandjak, 23-XI-61, bord de route.

Afrique centrale et occidentale.

Genre **RICANIA** GERMAR.

GERMAR, L., 1818, *Mag. Ent.*, III, p. 221.

**Ricania cervina** MÉLICHAR.

MÉLICHAR, L., 1898, *Ann. K. K. Naturh. Hofmus.*, Bd XIII, p. 229.

1 ex. : Forêt classée de Santiaba-Mandjak, 23-XI-61, sous-bois.  
Togo.

**Ricania quinquefasciata** STÅL.

STÅL, C., 1866, *Hem. Afric.*, IV, p. 225, p. 6.

5 ex. : Tabi, près de Bignona, 23-24-XI-61, à la lumière, en lisière de forêt.

Espèce décrite du Sénégal.

---