

ANTONIO SERVADEI

Istituto di Entomologia dell'Università di Padova

CONTRIBUTO ALLA COROLOGIA DEI RHYNCHOTA
HOMOPTERA AUCHENORRHYNCHA D'ITALIA

Nel catalogo dei Rhynchota Heteroptera e Homoptera Auchenorrhyncha ⁽¹⁾ da me compilato nel 1967, per ogni singola specie è indicata la sola regione e l'autore che la cita con la data di pubblicazione, e quindi le stazioni di raccolta sono facilmente reperibili nella consultazione dei lavori che sono elencati nella bibliografia annessa al catalogo fino a tutto il 1966.

Diverse specie però da me reperite in varie località italiane, e tra queste non poche nuove per la nostra fauna, non avendo fatto oggetto di alcuna memoria, non sono contrassegnate da alcuna data e, onde mantenere l'uniformità del catalogo, ne è indicata la sola regione e non la specifica località di raccolta.

Ritengo perciò che questa nota di completamento del catalogo in parola con l'indicazione delle diverse stazioni di raccolta venga a colmare una forzata lacuna e possa in qualche modo contribuire ad una sempre maggiore conoscenza della fauna italiana dei Rincoti.

Inoltre sono pure elencate per la prima volta nuove regioni che non figurano nel catalogo ed anche una nuova specie per la nostra fauna ⁽²⁾.

Fam. CIXIIDAE Spin.

Cixius (Paracixius) distinguendus Kb. - Trentino - Alto Adige :
Caldaro X; Sicilia : Bosco della Ficuzza IX.

Cixius (Paracixius) pallipes pallipes Fieb. - Friuli - Venezia
Giulia : Gorizia VIII; Emilia : Portonovo XI; Sardegna :
Sassari V, Oristano VI.

(1) ANTONIO SERVADEI - Rhynchota (Heteroptera, Homoptera Auchenorrhyncha) « Fauna d'Italia », Ed. Calderini, pp. I-X, 1-851, figg. 1-2.

(2) Le nuove regioni e la specie nuova sono precedute nella presente nota da un asterisco.

- Cixius (Paracixius) pallipes wagneri* China - Abruzzo e Molise: Fucino VII.
- Cixius (Ceratokixius) cunicularius* f. *fusca* Fieb. - Lombardia: Val Taleggio VIII; Veneto: Verona VII, Fumane V.
- Cixius (Ceratokixius) simplex* H.S. - Lazio: Fregene VI; Abruzzo e Molise: Pescara X; Basilicata: Nova Siri V, Potenza VI.
- Cixius (Acanthocixius) alpestris* f. *vindobonensis* Wagn. - Trentino-Alto Adige: Val Lagarina VII.
- Cixius (Acanthocixius) carniolicus* Wagn. - Piemonte: Chevrère VII; Campania: Lago Matese VII.
- Cixius (Orinocixius) austriacus* Wagn. - Piemonte: Chevrère VII.
- Cixius (Orinocixius) borussicus* Wagn. - I. Elba: Poggio Terme VI, Marche: Bolognola VI.
- Cixius (Orinocixius) heydeni* Kb. - Trentino-Alto Adige: Fortezza VIII, Val Eores VIII, Val Genova VI; Emilia: Foresta di Campigna VI.
- Cixius (Orinocixius) montanus* Hpt. - Emilia: Bologna VIII; Toscana: Impruneta IX, Tavarnuzze VIII, X.
- Cixius (Sciocixius) similis* Kb. - Basilicata: Potenza VI.
- Cixius (Cixius) nervosus* L. - Piemonte: Epinel VII, Frassiney VII, Vieyes VII; Lombardia: Sottochiesa VIII, Val Taleggio VIII, Varese VIII; Trentino-Alto Adige: Aldeno VII, Bressanone VIII, M. Bondone VIII, Ortisei VIII, Rovereto VIII, Pinzolo VIII, Val Genova VIII, Val Sole VII, VIII, IX; Friuli-Venezia Giulia: Ligosullo VI, Sedegliano VIII, IX, Tarvisio VII; Emilia: Foresta di Campigna VI, VII, VIII, Portonovo VIII, Zocca VIII; Toscana: Firenze Certosa V, Impruneta VI, Tavarnuzze VI, X, S. Baronto IX; Marche: Bolognola VI; Lazio: Fregene V, VI, Terminillo VIII; Campania: Rutino Stazione V; Sicilia: Siracusa IX.
- Cixius (Cixius) nervosus* f. *atava* Schumm. - Emilia: Portonovo IX.
- Tachycixius desertorum* Fieb. - Piemonte: Tortona IX; Toscana: Cecina VII; Abruzzo e Molise: Bosco Redole VII; Campania: Acquavena V, Centola V, Scario V.

- Tachycixius pilosus* Oliv. - A b r u z z o e M o l i s e : Parco Abruzzo, Camosciara VII; C a m p a n i a : Caprilia VI, Irpina VI.
- Tachycixius pilosus* f. *nigrita* Hpt. - T o s c a n a : Tavarnuzze IV, V.
- Oliarus cuspidatus* Fieb. - T r e n t i n o - A l t o A d i g e : Mori VII; C a m p a n i a : Acquavena V, Alfano V, Agropoli V, Castellabate V, Centola V, Letino VII, Mercato S. Severino V, Montano Antilia V, Paestum V, Palinuro V, Rutino Stazione V, Sapri S. M. di Cordici V, Scario V, Torre Orsaia V, Vallo Scalo V, Vi-bonati V; B a s i l i c a t a : Irsina VII, Rivello VI.
- Oliarus leporinus* L. - V e n e t o : Chioggia VII; M a r c h e : M. Conero VII.
- Oliarus melanocheatus* Fieb. - F r i u l i - V e n e z i a G i u l i a : Monfalcone VII; A b r u z z o e M o l i s e : Chieti VII.
- Oliarus pallens* Germ. - T r e n t i n o - A l t o A d i g e : Varna VII; V e n e t o : Laguna S. Erasmo VI; C a m p a n i a : Vallo Lucano V, IX; S i c i l i a : Bosco della Ficuzza IX, Lentini IX, Siracusa IX.
- Oliarus panzeri* P. Löw - F r i u l i - V e n e z i a G i u l i a : Lago di Fusine VII, Moggio Udinese VII, Sedegliano VIII, Tarvisio VII; T o s c a n a : Firenze Certosa VII, M. Morello VI; L a z i o : Circeo V; C a m p a n i a : Castello d'Alife VII, S. Gregorio Matese VII; B a s i l i c a t a : Maratea V.
- Oliarus perminutus* Dlab. - P u g l i a : Maglie VII; B a s i l i c a t a : Irsina VI.
- Oliarus quinquecostatus* Duf. - V e n e t o : Murano VI; E m i l i a : Grizzana VI, Miramare VII; A b r u z z o e M o l i s e : Parco Abruzzo, Camosciara VII.
- Trirhacus formosissimus* Costa - E m i l i a : Foresta Campigna VI, VII.
- Trirhacus setulosus* Fieb. - F r i u l i - V e n e z i a G i u l i a : Ligosullo VI.
- Hyalestes luteipes* Spin. - T r e n t i n o - A l t o A d i g e : Lizzana VIII; * F r i u l i - V e n e z i a G i u l i a : Monfalcone VII; A b r u z z o e M o l i s e : Avezzano VII, Fucino VII, Tagliacozzo VII, Campitello VII; C a m p a n i a : Auduni VII, Castello d'Alife VII, S. Gregorio Matese VII, Sassinoro VII; B a s i l i c a t a : Nova Siri VII, Rivello VII.

Hyalestes luteipes f. *scotti* Ferr. - Veneto: Ceraino VII; Basilicata: Nova Siri VII.

Hyalestes obsoletus Sign. - Friuli-Venezia Giulia: Castions VII.

Fam. ACHILIDAE Stal

Epiptera advena Spin. - Emilia: Bologna VII; Abruzzo e Molise: Bosco Redole VII; Campania: Auduni VII, Lago Matese VII, Sapri S. M. di Cordici V; Basilicata: Maratea V, Nova Siri VII.

Epiptera marginicollis Spin. - Trentino-Alto Adige: Isera VII, Lizzana VII, Rovereto VII; Veneto: * Ceraino VII.

Fam. DICTYOPHARIDAE Spin.

Dictyophara europaea L. - Piemonte: Cameri VII, Crescentino VIII; Friuli-Venezia Giulia: Codroipo IX, Tavagnacco VIII; Campania: S. Gregorio Matese VII.

Dictyophara europaea f. *rosea* Costa - Toscana: Chianciano VIII; Abruzzo e Molise: Chieti VIII, Assergi VII; Campania: Auduni VII; Basilicata: Lagonegro VII.

Dictyophara multireticulata M.R. - Veneto: Arquà Petrarca VII; Toscana: Chianciano VIII; Abruzzo e Molise: Avezzano VII; Basilicata: Lagonegro VII.

Bursinia genei Duf. - Trentino-Alto Adige: Val Lagarina VIII; Puglia: Peschici IX.

Bursinia genei f. *dispar* Horv. - Toscana: Tavarnuzze IX; Abruzzo e Molise: Assergi VIII, Avezzano VII, Forca Caruso VII.

Bursinia genei f. *parvula* Horv. - Basilicata: Lagonegro VII, Metaponto VII, Nova Siri VII.

Bursinia globiceps Linnav. - Sardegna: Calasetta VII.

Bursinia hemiptera Costa - Sicilia: Etna IX.

Fam. TROPIDUCHIDAE Stal

Trypetimorpha fenestrata Costa - Toscana: Chianciano VIII, S. Baronto IX; Marche: M. Ardizio X.

Trypetimorpha pilosa Horv. - Basilicata: Nova Siri VII.

Fam. ISSIDAE Spin.

Caliscelis bonellii Latr. - Friuli-Venezia Giulia: Doberdò del Lago VII, Monfalcone VII, Paludi Lisert VII; Umbria: Bivio Pietralunga IX; Campania: Castellabate V, Castello d'Alife VII, Pattano V, Paestum V, S. Gregorio Matese VII, Palinuro V, S. Lupo VII, Torre Orsaia V; Basilicata: Policoro VI, Nova Siri V.

Caliscelis wallengreni Stal - Friuli-Venezia Giulia: Lignano Pineta VII; Emilia: Portonovo VII, VIII.

Aphelonema melichari Horv. - Friuli-Venezia Giulia: Paludi Lisert VII.

Aphelonema quadrivittata Fieb. - Friuli-Venezia Giulia: Doberdò del Lago VII, Monfalcone VII; Abruzzo e Molise: Bosco Redole VII; Campania: Sapri S.M. di Cordici V, Scario VII.

Ommatidiotus dissimilis Fall. - Veneto: Jesolo VI, VII.

Ommatidiotus falleni Stal - Lazio: Fregene VII.

Mycterodus orthocephalus Ferr. - Trentino-Alto Adige: Aldeno IV; Emilia: Bologna VI, Foresta Campigna VI; Toscana: Monteriggioni IV.

Falcidius apterus F. - Basilicata: Matera VI.

Hysteropterum bilobum Fieb. - Puglia: Vieste VII.

Hysteropterum flavescens Oliv. - Friuli-Venezia Giulia: Pozzuolo del Friuli XI, Sedegliano VIII; Marche: Pesaro VII, Fano VII; Campania: S. Gregorio Matese VII, Sassinoro VII; Sicilia: Palermo VII; I. Asinara V.

Hysteropterum maculifrons M.R. - Lazio: Circeo V; Abruzzo e Molise: Bosco Redole VII, S. Nicola di Guardiaregia VII; Campania: Sassinoro VII; Puglia: Massafra V, Mottola V; Basilicata: Maratea V.

Hysteropterum maculipes Mel. - Lazio: Circeo V; Puglia: Cagnano Varano VII; Calabria: S. Cristina d'Aspromonte IX.

Hysteropterum oculatum Linnav. - I. Elba: Poggio Terme VI.

Hysteropterum pseudoarmatum Linnav. - Basilicata: Nova Siri VII.

Hysteropterum reticulatum H.S. - Friuli-Venezia Giulia: Amaro IV, Passo Tanamea VIII; Toscana: Firenze Casignano VII; I. Elba: Poggio Terme VI.

Hysteropterum schaefferi Mtc. - Trentino-Alto Adige: Rovereto VII; Emilia: Grizzana V, VI, Monzuno VIII; Toscana: S. Vincenzo VII; Lazio: Fregene IX.

Issus coleoptratus F. - Friuli-Venezia Giulia: Moggio Udinese VII; Basilicata: Nova Siri V.

Issus dilatatus Fourcr. - Campania: Alfano V, Capriglia Irpina VI, Castello d'Alife VII, Centola V, Corleto Monforte VI, Cuccaro Vetere V, Palinuro V, Pattano V, Rutino Stazione V, S. Gregorio Matese VII, Mercato S. Severino V, Scario V, Sapri S.M. di Cordici V, Tortorella V, Vibonati V.

Issus dilatatus f. lutea Fieb. - Toscana: Tavarnuzze VI; Abruzzo e Molise: Assergi VII; Campania: Centola V, Pattano V, Scario V, S. Gregorio Matese VII, Tortorella V; Basilicata: Lagonegro VII, Maratea V.

Issus lauri Ahrens - Emilia: Piacenza VI.

Fam. DELPHACIDAE Edw.

Asiraca clavicornis F. - Friuli-Venezia Giulia: Sedegliano IX; Marche: Ascoli Piceno, Colle S. Marco VI; Campania: Alfano V.

Kelisia brucki Fieb. - Veneto: Jesolo VII; Toscana: Sesto Fiorentino VI; Campania: Alfano V, Vallo Scalo V, Vibonati V.

Kelisia guttula Germ. - Toscana: Tavarnuzze VII; Campania: Centola V, Pattano V, Rutino Scalo V, Scario V.

Kelisia perrieri Rib. - Toscana: Chianciano VIII.

- Kelisia vittipennis* Shlb. - Trentino-Alto Adige: Lago Cei VIII, Mattarello IX, M. Plose IX; Friuli-Venezia Giulia: Fusine VII.
- Anakelisia perspicillata* Boh. - Trentino-Alto Adige: M. Plose IX.
- Ditropis pteridis* Spin. - Emilia: Foresta Campigna VI; Abruzzo e Molise: Rifugio Campitello VII; Campania: Casalbuono V, Montano Antilia V, Tortorella V.
- Nephropsia elegans* Costa - Basilicata: Nova Siri VII, IX.
- **Eurysa laetitia* Dlab. - Puglia: Castellana Grotte X.
- Eurysa lineata* Perr. - Trentino-Alto Adige: Spinga VII; Emilia: Foresta Campigna VI; Toscana: Firenze Casignano V, VII; Campania: Montano Antilia V.
- Stiroma affinis* Fieb. - Trentino-Alto Adige: Fortezza VIII, Nova Levante VI; Veneto: Asiago VII.
- Stiroma bicarinata* H.S. - Friuli-Venezia Giulia: Tarvisio VII.
- Metropis latifrons* Kb. - Piemonte: S. Nicolas VII; Puglia: Gargano V.
- Metropis latinus* Linnav. - Emilia: Foresta Campigna VI; Campania: Matese Passo Miralago VII; Puglia: Gargano V; Calabria: M. Scuro VI.
- Euconomelus lepidus* Boh. - Trentino-Alto Adige: Val Genova VIII.
- Euides basilinea* Germ. - Trentino-Alto Adige: Aldeno IV.
- Euides speciosa* Boh. - Trentino-Alto Adige: Val Lagarina V; Veneto: Padova VI.
- Delphax inermis* Rib. - Lazio: Fregene VII.
- Delphax meridionalis* Hpt. - Lombardia: Monvalle VIII; Trentino-Alto Adige: Faedo VIII; Emilia: Portonovo VIII.
- Chloriona glaucescens* Fieb. - Trentino-Alto Adige: Aldeno VI.
- Chloriona smaragdula* Stal - Veneto: Pellegrina IV.
- Chloriona vasconica* Rib. - Basilicata: Laghi di Monticchio VIII.

- Stenocranus fuscovittatus* Fairm. - Trentino-Alto Adige: Aldeno VII.
- Stenocranus minutus* F. - Trentino-Alto Adige: Nomi III; Emilia: Foresta Campigna VI, IX; Abruzzo e Molise: S. Eufemia a Maiella IV; Calabria: Lago Arvo IX, S. Giovanni in Fiore VIII.
- Megamelus mulsanti* Fieb. - Toscana: Firenze VI.
- Megamelus notula* Germ. - Trentino-Alto Adige: Aldeno VI, Rovereto VI, Val Genova VII.
- Metadelphax sordidula* Stal - Lombardia: Val Taleggio VIII; Trentino-Alto Adige: Lago Careser VIII, Mezzaselva VIII.
- Laodelphax elegantula* Boh. - Trentino-Alto Adige: Lago Landro VIII; Umbria: Foligno VII.
- Laodelphax striatella* Fall. - Piemonte: Castellazzo Novarese VII; Lombardia: Bergamo V, Pavia IX; Trentino-Alto-Adige: Bressanone VIII, Luson VII, M. Plose IX, Rovereto VII; Veneto: Chioggia VIII, Laguna S. Giuliano VIII, Padova VI, VII, Val Dogà IV, Verona VI; Friuli-Venezia Giulia: Paludi Lisert VII; Emilia: Portonovo VIII; Umbria: Foligno VII; Basilicata: Laghi Monticchio VIII; Sicilia: Messina IX.
- Ditropsis flavipes* Sign. - Piemonte: S. Nicolas VII; Trentino-Alto Adige: Bressanone VIII, Lago Landro VIII.
- Megamelus fieberi* Scott - Campania: Paestum V; Puglia: Lago Alimini X.
- Delphacodes audrasi* Rib. - Emilia: Portonovo IX; Toscana: Firenze VI, Fucecchio IV.
- Muellerianella brevipennis* Boh. - Emilia: Foresta Campigna IX.
- Muellerianella fairmairei* Perris - Veneto: Asiago VII, Campodarsego VI, Negrar X, Padova VI.
- Muirodelphax aubei* Perris - Veneto: Chioggia V, Jesolo VII, Laguna S. Giuliano VIII, Val Dogà IV, Vignole VI; Emilia: Portonovo VIII; Toscana: M. Calvana VII; Abruzzo e Molise: Parco Abruzzo Val Fondillo VII; Campania: Paestum V.

- Muirodelphax exigua* Boh. - Trentino-Alto Adige: M. Bondone VIII; Veneto: Verona V.
- Dicranotropis divergens* Kb. - Piemonte: Cogne VII, Valnontey VII; Veneto: Asiago VII.
- Dicranotropis hamata* Boh. - Piemonte: Chevrère VII, Epinel VII, Frassiney VII; Trentino-Alto Adige: Bressanone VIII, Val Pusteria VIII; Veneto: Asiago VII; Friuli-Venezia Giulia: Lago Fusine VII, Passo Predil VII, Valbruna VII; Emilia: Foresta Campigna IX; Calabria: Lago Arvo V.
- Kosswigianella spinosa* Fieb. - Liguria: M. Penna IX; Veneto: Cansiglio VI.
- Xanthodelphax straminea* Stal - *Campania: Montano Antilia V.
- Paradelphacodes paludosa* Fl. - Lombardia: Monvalle VIII.
- Metadelphax propinqua* Fieb. - Lombardia: Monvalle VIII, Pavia IX; Veneto: Jesolo V, Negrar X, Padova VII; Friuli-Venezia Giulia: Sedegliano VII, Tarvisio VII; Emilia: Portonovo VIII; Toscana: Nave a Rovezzano VIII, S. Vincenzo IX; Abruzzo e Molise: Parco Abruzzo Val Fondillo VII; Campania: Casaletto Spartano V, Alfano V, Mercato S. Severino V, Sapri S.M. di Cordici V, Torre Orsaia V; Basilicata: Nova Siri V, VII, IX, Policoro VI, S. Basile VI.
- Javesella discolor* Boh. - Piemonte: Cogne VII, Valnontey VII; Veneto: Asiago VII, Cansiglio VI.
- Javesella dubia* Kb. - Trentino-Alto Adige: Borgo Valsugana VIII, Naz VIII, Volano IX; Veneto: Asiago VII, Cansiglio VI; Toscana: Tavarnuzze IV; Abruzzo e Molise: Rifugio Campitello VII.
- Javesella forcipata* Boh. - Friuli-Venezia Giulia: Tarvisio VII.
- Javesella obscurella* Boh. - Trentino-Alto Adige: Fortezza VIII, Luson VII, Naz VIII, Val Genova VIII; Veneto: Cansiglio VI; Emilia: Foresta Campigna VI.

Javesella pellucida F. - Trentino-Alto Adige: Mezzaselva VIII; Abruzzo e Molise: Boiano VII, Guardiaregia S. Nicola VII.

Ribautodelphax albostriata Fieb. - Trentino-Alto Adige: Fortezza VIII, Spinga VII; Toscana: Chianciano VIII.

Ribautodelphax collina Boh. - Trentino-Alto Adige: Lago Toblino X.

Ribautodelphax imitans Rib. - Emilia: Forlì VIII.

Ribautodelphax pungens Rib. - Lazio: Terminillo VII.

Fam. TETTIGOMETRIDAE Germ.

Tettigometra atra Hag. - Veneto: Verona V, Caselle V, Campofontana III; I. Elba: Poggio Terme VI; Lazio: Terminillo VII; Abruzzo e Molise: Bosco Redole VII; Campania: S. Gregorio Matese VII.

Tettigometra atrata Fieb. - Piemonte: Limone Piemonte VIII.

Tettigometra costulata Fieb. - Campania: Castellabate V, Palinuro V, Rutino Scalo V, S. Severino V, Torre Orsaia V, Vallo Scalo V.

Tettigometra fusca Fieb. - Trentino-Alto Adige: Molveno IX; Friuli-Venezia Giulia: Pradielis IV.

Tettigometra griseola Fieb. - Calabria: Albi VIII, M. Scuro VIII.

Tettigometra griseola f. *bimaculata* Am. & Serv. - Abruzzo e Molise: Avezzano VII.

Tettigometra impressifrons M.R. - Toscana: Firenze VIII, Scandicci VI; Campania: Castellabate V, Vallo Scalo V, Vibonati V; Sicilia: F. Ciane IV, Lentini IX.

Tettigometra impressopunctata Duf. - Piemonte: Limone Piemonte VIII; Lombardia: Val Taleggio VIII.

Tettigometra laeta H.S. - Veneto: Ceraino VII; Emilia: Bologna V; Toscana: Firenze Certosa X, S. Casciano VI, Sesto Fiorentino III, Tavarnuzze VII; Campania: Mercato S. Severino V, Palinuro V, Acquavena V.

Tettigometra obliqua Pnz. - Trentino-Alto Adige: Aldeno VII, Lago di Cei VIII; Emilia: Bertinoro VI; Toscana: Chianciano VIII, Firenze Casignano VII, Firenze Certosa X, M. Morello VI, Tavarnuzze IV, V, VI, VII; Lazio: Circeo V; Abruzzo e Molise: Fucino VII; Campania: Castello d'Alife VII, Mercato S. Severino V; Basilicata: Laghi di Monticchio VIII; Sicilia: Bosco della Ficuzza IX.

Tettigometra obliqua f. *binotata* Mtc. - Emilia: Bologna VI; I. Elba: Poggio Terme VI; Campania: Castello d'Alife VII.

Tettigometra obliqua f. *panzeri* Fieb. - Toscana: Tavarnuzze X; Campania: Palinuro V.

Tettigometra obliqua f. *platytaenia* Fieb. - Toscana: Donnini III, Tavarnuzze VI; Sicilia: Bosco della Ficuzza IX.

Tettigometra obliqua f. *tritaenia* Fieb. - Toscana: Tavarnuzze VI, VIII, Nave a Rovezzano VIII; I. Elba: Poggio Terme VI; Lazio: Circeo V; Campania: S. Gregorio Matese VII; Basilicata: Potenza VI.

Tettigometra obliqua f. *vulgaris* Fieb. - Lombardia: Varese VII; Toscana: Firenze Casignano VII, Sesto Fiorentino X, Tavarnuzze VI; Lazio: Circeo V.

Tettigometra sanguinea Leth. - Campania: S. Gregorio Matese VII.

Tettigometra sulphurea M.R. - Liguria: Bocca di Magra VII.

Tettigometra virescens Pnz. - Toscana: Chianciano VIII; Campania: S. Gregorio Matese VII; Basilicata: Nova Siri IX.

Tettigometra virescens f. *bicolor* Costa. - Emilia: Bologna VI; Abruzzo e Molise: Rifugio Campitello VII, M. Caruso VII.

Brachycephala barani Sign. - Puglia: Gargano V.

Brachycephala brachycephala Fieb. - * Veneto: Verona V; Umbria: Foligno VI; Campania: Castellabate V; Basilicata: F. Ofanto VIII; Sicilia: Etna IX.

Brachyceph longicornis Sign. - I. Elba: Poggio Terme VI; Lazio: Circeo V; Campania: Casaletto Spartano V, Mercato S. Severino V, S. Gregorio Matese VII; * Puglia: Gargano V.

Fam. CICADIDAE Latr.

Tibicen plebejus Scop. - Piemonte: S. Nicolas VII; Trentino-Alto Adige: Vallarsa VII; Veneto: Cison di Valmarin VII, Negrar VIII; Friuli-Venezia Giulia: Monrupino VIII; Toscana: Firenze Certosa VII, Tavarnuzze VI, VII; Abruzzo e Molise: M. Caruso VII; Puglia: Bisceglie VIII; Sardegna: Nurri VIII.

Cicadatra atra Oliv. - Toscana: Firenze Certosa VII, Tavarnuzze VII; Lazio: Capena VI.

Cicada orni L. - Piemonte: S. Nicolas VII; Friuli-Venezia Giulia: Cervignano del Friuli VIII, Mossa VII, Udine VII; Abruzzo e Molise: M. Caruso VII; Campania: Castello d'Alife VII.

Tibicina haematodes Scop. - Trentino-Alto Adige: Vallarsa VI; Veneto: Negrar VIII, Rovigo VIII; Toscana: Firenze Certosa VII, Tavarnuzze VI; Calabria: Gambarie VII.

Cicadetta argentata Oliv. - * Friuli-Venezia Giulia: Colloredo VIII.

Cicadetta brullei Fieb. - Lombardia: Monvalle VIII; Toscana: M. Calvana VI, Firenze VI.

Cicadetta montana Scop. - Trentino-Alto Adige: Vallarsa VI; Emilia: Bologna VII; Toscana: Caldine IV.

Cicadetta montana f. *dimidiata* F. - Trentino Alto Adige: Mori VI.

Cicadetta tibialis Pnz. - Friuli-Venezia Giulia: Gorizia VI; Emilia: Bologna VI, Foresta Campigna IX, Gaibola VI; Toscana: Firenze Casignano VII, Firenze Certosa VI, Tavarnuzze VI.

Euryphara mediterranea Fieb. - Toscana: Firenze IV, Caldine IV; Calabria: Strongoli VII.

Fam. CERCOPIDAE Evans

Cercopis arcuata Fieb. - Trentino-Alto Adige: Rovereto V; Friuli-Venezia Giulia: Musi V, Remanzacco V, Trieste V; Emilia: Bologna VI, Foresta Campigna VI; Toscana: Donnini IV; Marche: Cornillo Nuovo V, VI; Abruzzo e Molise: Aringo VI, Lago Campotosto VI, M. della Laga Ceppo VI; Sicilia: M. Cuccio V.

Cercopis sanguinolenta sanguinolenta Scop. - Abruzzo e Molise: Aringo VI, Lago Campotosto VI, M. della Laga Ceppo VI, Rionero Sannitico VI, Senarica VI; Campania: Casalbuono V, Casaletto Spartano V, Capriglia Irpina VI, Mercato S. Severino V, Paestum V; Basilicata: Atella VI, Bosco Montechiano VI, Irsina VI, Matera VI, Nova Siri V, Bosco di Picciano VI, Ponte Vonchia VI, Policoro VI, Potenza VI.

Cercopis vulnerata Rossi - Lombardia: Mantova Boscofontana V; Abruzzo e Molise: Aringo VI, Lago Campotosto VI, Pescara V, Montesilvano V, Senarica VII; Campania: Acquavena V, Casalbuono V, Lago Matese VII, Letino VII, Torre Orsaia V; Basilicata: Ponte Vonchia VI.

Cercopis vulnerata f. *helvetica* Mel. - Veneto: Verona IV; Emilia: Foresta Campigna VI; Toscana: Fiesole VI, Poggibonsi V, Tavarnuzze V; Calabria: Lago Arvo V.

Haematoloma dorsata Ahr. - Friuli-Venezia Giulia: Amaro IV, Venzona IV.

Haematoloma dorsata f. *lugens* Horv. - Friuli-Venezia Giulia: Amaro IV, Venzona IV; Calabria: Buturo V, Camigliatello VI, Gambarie d'Aspromonte VI, Lago Arvo V, VI.

Haematoloma dorsata f. *quinquemaculata* Germ. - Friuli-Venezia Giulia: Musi V, Venzona VI; Emilia: Foresta Campigna VI, Madonna dell'Acero V, Passo Mandrioli V; Toscana: Bosco del Teso VI.

Fam. APHRODIDAE Am. & Serv.

Lepyronia coleoptrata L. - Friuli-Venezia Giulia: Castions VII, Fanna VII, Remanzacco VIII, Romans VIII, Sedegliano VIII, IX; Toscana: Chianciano VIII, F. Bisenzio VI, Ta-

varnuzze VII; Umbria: Bivio Pietralunga IX; Campania: Casalbuono V, Castello d'Alife VII, Lago Matese VII, Letino VII, Mercato S. Severino V, Torre Orsaia V, Paestum V, Sapri S.M. di Cordici V, Scario V, S. Gregorio Matese VII, Sassinoro VII, Vibonati V, S. Lupo VII.

Philaenus leucophthalmus L. - Piemonte: Cameri VII; Trentino-Alto Adige: Ortisei VIII, Val Genova VIII; Friuli-Venezia Giulia: Cave Predil VII; *Emilia: Bologna VII, IX, Grizzana VI, Miramare VII, Zocca VIII; I. Elba: Poggio Terme VI; Campania: Pattano V.

Philaenus leucophthalmus f. *albomaculata* Schrk. - Trentino-Alto Adige: L. Lavarone VIII, Pellizzano VIII, Folgaria VIII; Friuli-Venezia Giulia: Fusine in Valromana VII, Passo Predil VII.

Philaenus leucophthalmus f. *dimidiata* H.S. - Trentino-Alto Adige: Ortisei VIII, Val di Vizze VII.

Philaenus leucophthalmus f. *fasciata* F. - Piemonte: Limone Piemonte VIII; Lombardia: Bergamo VIII, Besozzo VIII, Monvalle VIII; Trentino-Alto Adige: Bressanone VIII, Nave S. Rocco VII; Friuli-Venezia Giulia: Camporosso in Valcanale VII, Paludi Lisert V, Tarvisio Rutte VII; Emilia: Bologna VI, VII, IX, Balze VII, Foresta Campigna VIII, IX, Monzuno VIII, Portonovo VII, VIII, Val Savena VIII, Zocca VII; Toscana: Chianciano VIII, Firenze VI, Tavarnuzze VI, X, Vicchio IV; Abruzzo e Molise: Rifugio Campitello VII, Pescara X, Roccamondolfi VII, Guardiaregia S. Nicola VII; Campania: Castellabate V, Letino VII, Pattano V, S. Gregorio Matese VII, Scario V, Torre Orsaia V, Vibonati V; Basilicata: Atella VI, Bosco Montechiano VI, Vulture VIII; Sardegna: Arborea V.

Philaenus leucophthalmus f. *gibba* F. - Trentino-Alto Adige: Luson VII, Pederù VIII, Val di Vizze VII.

Philaenus leucophthalmus f. *hafniensis* Gmel. - Piemonte: Limone Piemonte VIII, Tortona IX; Lombardia: Besozzo VIII, Monvalle VIII, Sottochiesa VIII, Val Taleggio VIII; Trentino-Alto Adige: Ortisei VII, Pederù VIII, Val di Funes VIII; Friuli-Venezia Giulia: Lago di Fusine VII,

Paludi Lisert V, Passo Tanamea VIII, Predil VII, Tarvisio VII; Emilia: Bologna IX, Zocca VII, Grizzana V, Monzuno VIII, Portonovo VIII, Vernasca VIII; Toscana: Carmignano VII, Chianciano VIII, S. Baronto IX; Abruzzo e Molise: Avezzano VII, Boiano VII, Parco Abruzzo Val Fondillo VII, Pescasseroli VII; Campania: Casalbuono V, Castellabate V, Capriglia Irpina VI, Capo Palinuro V, Letino VII, Sapri S.M. di Cordici V; Puglia: Avetrana VII, Otranto VII; Basilicata: Bosco di Picciano VI, Laghi di Monticchio VIII, Ponte Vonchia VI, Vulture VIII; Sicilia: Bosco della Ficuzza IX.

Philaenus leucophthalmus f. *lateralis* L. - Piemonte: Limone Piemonte VIII; Trentino-Alto Adige: Ortisei VII, Pederù VIII, Val di Vizze VII; Veneto: Asiago VII, Valle del Cordevole VIII; Friuli-Venezia Giulia: Camporosso in Val Canale VII, Fusine in Valromana VII, Valle Ugovizza VII, Rifugio Nordio VII, Tarvisio Rutte VII, Poscolle VII, Vedronza VII; Emilia: Bologna IX, Monzuno VIII, Portonovo IX, Val Savena VIII, Zocca VIII; Toscana: Carmignano VII, Firenze Certosa VII, Tavarnuzze VII; Abruzzo e Molise: Pescara F. Tavo X; Campania: Casalbuono V, Pattano V; Basilicata: Vulture VIII; Sicilia: Bosco della Ficuzza IX.

Philaenus leucophthalmus f. *leucocephala* L. - Piemonte: Vieyes VII; Lazio: Terminillo VII; Campania: Torre Orsaia V; Sicilia: Bosco della Ficuzza IX; Sardegna: Sassari X.

Philaenus leucophthalmus f. *oenotherae* Scop. - Piemonte: Lillaz VII, Limone Piemonte VIII, Tortona VII, Valnontey VII; Cogne VII, Valsavaranche VII; Lombardia: Bergamo VIII, Novogro VIII, Valeggio VIII, Val Taleggio VIII; Trentino-Alto Adige: Cadipietra VIII, Folgaria VIII, Lavarone VIII, Pellizzano VIII; Friuli-Venezia Giulia: Tarvisio VII, Valbruna VII; Emilia: Bologna VII, IX, Foresta Campigna VII, Grizzana V, Marzabotto VIII, Monzuno VIII, Miramare VII, Portonovo V, Riccione VII, Val Savena VIII, Tavernago VI, Vernasca VIII, Zocca VIII; Toscana: Galluzzo V; I. Elba: Poggio Terme VI; Marche: Senigallia V; Abruzzo e Molise: Rifugio Campitello VII, Chieti VIII,

Parco Abruzzo Val Fondillo VI, Roccamondolfi VII, Guardia-regia S. Nicola VII; C a m p a n i a : Agropoli V, Casalbuono V, Capriglia Irpina VI, Castellabate V, Centola V, Paestum V, Pat-tano V, Torre Orsaia V, Vallo Scalo V, S. Marco V; B a s i l i - c a t a : Atella V, Bosco Montechiano VI, Metaponto V, Mon-ticchio VIII, Ponte Vonchia VI, Vulture VIII; S i c i l i a : Bosco della Ficuzza IX, Etna IX, Messina IX; S a r d e g n a : Sassari VI, Tissi VII.

Philaenus leucophthalmus f. *populellus* Mtc. - P i e m o n t e : Cogne VII, Epinel VII, Limone Piemonte VIII, Valgrisanche VII, Valsavaranche VII; L o m b a r d i a : Bergamo VIII, Besozzo VIII, Monvalle VIII, Segrate VIII; T r e n t i n o - A l t o A - d i g e : Bressanone VIII, Cadipietra VIII, Ortisei VIII, Rio Pusteria VIII, Val Funes VIII, Pellizzano VIII, Folgaria VIII; F r i u l i - V e n e z i a G i u l i a : Castions VII, Lago Predil VII, Passo Predil VII, Tarvisio VII, Sedegliano VIII; E m i - l i a : Bologna VIII, Grizzana VI, Foresta di Campigna VIII, Marzabotto VIII, Borghi VI, Zocca VIII, Monzuno VIII, Por-tonovo VII, VIII, Tavernago VI, Vernasca VIII; T o s c a n a : Fiesole VI, Galluzzo V, Tavarnuzze VI, Valle Orsigna VIII; A b r u z z o e M o l i s e : Boiano VII, Rifugio Campitello VII, Pescara V; C a m p a n i a : Capriglia Irpina V, VIII, Lago Ma-tese VII, Letino VII, S. Gregorio Matese VII; B a s i l i c a t a : Atella VI, Bosco di Picciano V, Matera VI, Ponte Vonchia VI; S i c i l i a : Bosco della Ficuzza IX; S a r d e g n a : Bunnari VII, Alghero VI, Lago Baratz V, Macomer VI, Sassari V; *I. A s i n a r a V.

Philaenus leucophthalmus f. *quadrinaculata* Schrk. - P i e m o n t e : Epinel VII, Frassinè VII, Lillaz VII, Limone Piemonte VIII, Vieyes VII; L o m b a r d i a : Bergamo VIII, Monvalle VIII, Sottochiesa VIII; T r e n t i n o - A l t o A d i g e : Aldeno VI, Bressanone VIII, Civezzano VIII, Folgaria VIII, Lago Landro VII, Lago Lavarone VIII, Luson VII, M. Bondone VII, Pederù VIII, Pellizzano VIII, Val di Vizze VII; F r i u l i - V e n e z i a G i u l i a : Cave Predil VII, Doberdò del Lago VII, Interneppo VII, Lago Fusine VII, Lago Predil VII, M. Priesnig VII, Se-degliano VII, Tarvisio VII, Valbruna VII, Valle Ugovizza VII, Rifugio Nordio VII; E m i l i a : Bologna VI, Cervia IX, Fo-

resta Campigna VIII, IX, Grizzana VI, Monzuno VIII, Val Savena VIII, Zocca VIII, Vernasca VIII, Tavernago VI; Toscana: Badia a Ripoli IX, Chianciano VIII, Valle Orsigna VIII, Vallombrosa VIII; I. Elba: Poggio Terme VI; Marche: Pesaro VI; Abruzzo e Molise: Fucino VII, Parco Abruzzo Val Fondillo VII, Pescara V, Pescasseroli VII, Parco Abruzzo Camosciara VII, Rionero Sannitico VI; Campania: Capriglia Irpina VI, Casalbuono V, Castellabate V, Centola V, Cuccaro Vetere V, Pattano V, Paestum V, Rutino Stazione V, Scario V, Torre Orsaia V; Puglia: Massafra V, M. S. Angelo V, Gioia del Colle V, Otranto VII, Presicce VII, Ugento VII; Basilicata: Nova Siri V, Policoro VI, Tolve VI, Potenza VI, F. Cavone V, Lago Sirino VII; Sicilia: Etna IX, Bosco della Ficuzza IX.

Philaenus leucophthalmus f. *quadripunctata* Schrk. - Piemonte: Cré VII; Toscana: Firenze Certosa V, Firenze Casignano VII; Abruzzo e Molise: Avezzano VII, Fucino VII, Lettomannoppello X, Pescara X.

Philaenus leucophthalmus f. *rufescens* Mel. - Piemonte: Limone Piemonte VIII; Lombardia: Monvalle VIII; Trentino-Alto Adige: Aldeno VII, Bressanone VIII, Folgaria VIII, Mezzaselva VIII, Ortisei VIII, Val Funes VIII; Emilia: Bologna IX, Grizzana V, Miramare VII, Portonovo VIII, Val Savena VIII, Vernasca VIII, Zocca VIII; Toscana: Chianciano VIII, Valle Orsigna V; Lazio: Torricella Sabina VIII; Abruzzo e Molise: Assergi VII, Chieti VIII, Fucino VII, Guardiaregia S. Nicola VII, Parco Abruzzo Camosciara VII, Pescara X, Rifugio Campitello VII; Campania: Letino V, Rutino Stazione V, Torre Orsaia V; Basilicata: Laghi di Monticchio VIII, Nova Siri V, Picciano VI, Vulture VIII, Potenza VI; Sicilia: Etna IX, Bosco della Ficuzza IX.

Philaenus leucophthalmus f. *spumaria* L. - Friuli-Venezia Giulia: Castions VII, Sedegliano VIII; I. Elba: Poggio Terme VI; Campania: Capriglia Irpina VI, Agropoli V, Casalbuono V, Capo Palinuro V, Paestum V, Letino VII, Rutino Stazione V.

Philaenus leucophthalmus f. *trilineata* Schrk. - Lombardia: Sottochiesa VIII; Trentino-Alto Adige: Bondone VII, Lago Landro VIII, Laghetti Lavarone VIII, Val Genova VIII, Cima Posta VII; Friuli-Venezia Giulia: Lago Fusine VII, Lago Predil VII, Passo Predil VII; Emilia: Bologna VII, IX, Foresta Campigna IX, Grizzana VI, Monzuno VIII, Portonovo VII, VIII, Val Savena VIII, Vernasca VIII; Toscana: Firenze Certosa VI, Galluzzo IX, Tavarnuzze VI, Chianciano VIII, Valle Orsigna VIII; I. Elba: Poggio Terme VI; Lazio: Circeo V; Abruzzo e Molise: Boiano VII, Parco Abruzzo Camosciara VII; Campania: Casalbuono V, Letino VII, Pattano V, Sapri S.M. di Cordici V, Torre Orsaia V; Basilicata: Matera VI, Laghi di Monticchio VIII; Sicilia: Etna IX, Bosco della Ficuzza IX.

Philaenus leucophthalmus f. *vittata* F. - Emilia: Bologna VIII, Cervia IX, Foresta Campigna V, Miramare VII, Monzuno VIII, Portonovo VIII, Zocca VIII; Toscana: Bosco Teso VIII, M. Morello IX, Sesto Fiorentino X, Tavarnuzze V, Vicchio IX; Lazio: Circeo V; Abruzzo e Molise: Pescara V; Campania: Agropoli V, Casalbuono V; Basilicata: Nova Siri V; Sicilia: Etna IX, Bosco della Ficuzza IX; Sardegna: Arborea V.

Philaenus leucophthalmus f. *xanthocephala* Schrk. - Piemonte: Limone Piemonte VIII; Lombardia: Bergamo VIII, Monvalle VIII, Sottochiesa VIII, Val Taleggio VIII; Trentino-Alto Adige: Civezzano VIII, Folgaria VIII, Laghetti Lavarone VIII, Pieve di Ledro VIII, M. Bondone VII, Pellizzano VIII; Friuli-Venezia Giulia: Ligosullo VI, Passo Predil VII, Tarvisio VII; Emilia: Bologna IX, Portonovo VIII, Grizzana V, Zocca VIII; Toscana: Chianciano VIII, Galluzzo V, Tavarnuzze IX; Abruzzo e Molise: Boiano VII, Bosco Redole VII, Guardiaregia S. Nicola VII, Pescasseroli VII, Parco Abruzzo Camosciara VII, Rifugio Campitello VII, Roccamondolfi VII; Campania: Capriglia Irpina VI, Castello d'Alife VII, Letino VII; Basilicata: Irsina VI, Laghi Monticchio VIII, Vulture VIII, Nova Siri V, F. Cavone V; Sicilia: Bosco della Ficuzza IX, Etna IX.

- Philaenus signatus* Mel. - Campania: Paestum V; Puglia: Gioia del Colle V; Basilicata: Picciano VI, Potenza VI.
- Neophilaenus albipennis* F. - Friuli-Venezia Giulia: Lago Predil VII; * Sicilia: Bosco della Ficuzza IX, Messina IX.
- Neophilaenus campestris* Fall. - Friuli-Venezia Giulia: Monfalcone VII, Paludi Lisert V; Campania: Acquavena V, Alfano V, Casalietto Spartano V, Capo Palinuro V, Castellabate V, Cuccaro Vetere V, Centola V, Mercato S. Severino V, Montano Antilia V, Rutinio Stazione V, Sapri S.M. di Cordici V, Sassinoro VII, Torre Orsaia V; Basilicata: Metaponto V.
- Neophilaenus campestris* f. *brunnifrons* Rey - I. Elba: Poggio Terme VI.
- Neophilaenus campestris* f. *fasciata* Ferr. - Friuli-Venezia Giulia: Paludi Lisert V; Abruzzo e Molise: Avezzano VII; Campania: Casalietto Spartano V, Centola V, Cuccaro Vetere V, Mercato S. Severino V; Sardegna: Sassari VII.
- Neophilaenus campestris* f. *obsoleta* Ferr. - Toscana: Fiesole VI; Lazio: Circeo V; Campania: Alfano V, Casalietto Spartano V, Palinuro V; Puglia: Gioia del Colle V; Basilicata: Metaponto V; Sicilia: Bosco della Ficuzza IX, Etna IX; Sardegna: Cagliari VI, Macomer VI.
- Neophilaenus campestris* f. *simulans* Ferr. - Friuli-Venezia Giulia: Paludi Lisert V; Emilia: Bologna IX; Toscana: Chianciano VIII, Firenze IX; Marche: Loreto VII; Abruzzo e Molise: Chieti VIII; Puglia: Gioia del Colle V, Vico Garganico VII; Basilicata: Metaponto V; Calabria: Castrovillari V, Cerenza VI, Fuscaldo VI, Lago Ampollino VI, Mazzaccara VI.
- Neophilaenus exclamationis exclamationis* Thunb. - Trentino-Alto Adige: Bressanone VIII, Plose IX, Passo Sella VIII; Friuli-Venezia Giulia: M. Prisnig VII.
- Neophilaenus exclamationis exclamationis* f. *diluta* Shlb. - Trentino-Alto Adige: Rovereto VII.
- Neophilaenus infumatus* Hpt. - Piemonte: Cré VII, St. Nicolas VII; Trentino-Alto Adige: Bressanone VIII; Friuli-Venezia Giulia: Tarvisio VII; Toscana: Ta-

varnuzze X; Lazio: Terminillo VIII; Abruzzo e Molise: Maiella VIII, Rifugio Campitello VII; Campania: Matese VII; Sicilia: Lentini IX.

Neophilaenus limpidus Wagn. - Piemonte: Valnontey VII.

Neophilaenus lineatus L. - Trentino-Alto Adige: Fortezza VIII, Naz VIII, Pederù VIII; Friuli-Venezia Giulia: Doberdò del Lago VII, Fusine VII, M. Prisnig VII, Colle Medea V, Lago Predil VII, Paludi Lisert VII, Passo Tanamea VIII, Valbruna VII, Venzona VI; Emilia: Ravenna IX; Abruzzo e Molise: Parco Abruzzo Val Fondillo VII, VIII; Puglia: Presicce VII; Basilicata: Maratea VII, Nova Siri V, Policoro VI; Sicilia: Etna IX.

Neophilaenus lineatus f. *aterrima* Shlb. - Friuli-Venezia Giulia: Fusine in Valromana VII.

Aphrophora corticea Germ. - Trentino-Alto Adige: Appiano VIII, Brusago VII, Lago Carezza VII, Tret IX.

Aphrophora forneri Hpt. - Piemonte: Limone Piemonte VIII; Trentino-Alto Adige: Luson VII, Rio Pusteria VIII; Veneto: Valli del Pasubio VII; Friuli-Venezia Giulia: Camporosso VII, Fusine in Valromana VII, Lago Predil VII, Tarvisio VII; Emilia: Foresta Campigna VI; Abruzzo e Molise: Pescasseroli VII.

Omaloptera salicis De Geer - Piemonte: Limone Piemonte VIII, Vercelli VIII, Piaggia VII; Trentino-Alto Adige: Folgaria VIII, L. Lavarone VIII, Pellizzano VIII; Emilia: Monzuno VIII, Piacenza VI; Toscana: Palazzolo VIII, S. Ellero IX; Abruzzo e Molise: Pescasseroli VII, Parco Abruzzo Val Fondillo VII.

Trigophora cincta Thunb. - Toscana: Chianciano VIII, Firenze Casignano VII, Bosco Teso VII, VIII, Tavarnuzze VI; Umbria: Bivio Pietralunga IX; Campania: Alfano V, Casalbuono V, Castello d'Alife V, Centola V, Cuccaro Vetere V, Letino VII, Montano Antilia V, Pattano V, Rutino Stazione V, Sanza V, Scario V, Sapri S.M. di Cordici V, Torre Orsaia V, Tortorella V.

Europhora major Uhler - Lombardia: Besozzo VIII, Monvalle VIII.

Fam. MEMBRACIDAE Raf.

- Gargara genistae* F. - Trentino-Alto Adige: Rovereto VII; Veneto: Ceraino VII; Friuli-Venezia Giulia: Monfalcone VII; Emilia: Monzuno VIII; Toscana: Chianciano VIII, Firenze Casignano VII, Granaiolo VII, Tavarnuzze VI, VII; Marche: Urbino VIII; Abruzzo e Molise: Bosco Redole VII, Pescosansonesco VIII, Rifugio Campitello VII; Campania: Auduni VII, Castello d'Alife VII, San Lupo VII; Basilicata: Lagonegro VII, Lago Sirino VII, Nova Siri VII.
- Centrotus cornutus* L. - Lombardia: Mantova V; Friuli-Venezia Giulia: Codroipo VII, Moggio Udinese V, Tavagnacco VIII; Lazio: Fregene V, Rieti VII; Basilicata: M. Vulture VI.
- Centrotus cornutus* f. *gallica* Kb. - Piemonte: Acqui VII; Liguria: Genova VII; Friuli-Venezia Giulia: Gemona VII; Toscana: Bosco Teso VIII, Firenze Certosa V, Poggibonsi VI, Tavarnuzze VI.
- Centrotus cornutus* f. *italica* Kb. - Liguria: Genova VII, St. Martin Vesubie VI; Emilia: Imola VI; Toscana: Tavarnuzze VI.
- Centrotus cornutus* f. *kirschbaumi* Mtc. - Toscana: Bosco Teso VII.
- Centrotus cornutus* f. *sicula* Kb. - Piemonte: Val Savaranche VII; Friuli-Venezia Giulia: Moggio Udinese VII, Trieste V, Udine IV; Emilia: Foresta Campigna VI; Toscana: Tavarnuzze V.
- Centrotus cornutus* f. *turcica* Kb. - Trentino-Alto Adige: Bressanone VII; Veneto: Mestre VII, Tambre VII; Friuli-Venezia Giulia: Lusevera VI, Musi V, Trieste IV; Basilicata: Potenza VI.
- Ceresa bubalus* F. - Piemonte: Crescentino VIII, Ivrea VII, Vercelli VII; Lombardia: Cremona IX; Veneto: Legnaro VIII, Cologna Veneta VIII, Vicenza IX; Friuli-Venezia Giulia: Sagrado VIII, Sedegliano VIII; Emilia: Bologna IX, Parma IX, Piacenza VII.

Fam. CICADELLIDAE Latr.

- Megophthalmus scabripennis* Edw. - Emilia: Grizzana V, Polenta VI; Abruzzo e Molise: Pescara V; Campania: Casalbuono V, Acquavena V, Montano Antilia V, Pattano V, Rutino Scalo V, Torre Orsaia V; Puglia: Gioia del Colle V.
- Megophthalmus scanicus* Fall. - Piemonte: Castellazzo Novarese VI; Trentino-Alto Adige: Castel Tesino VIII; Friuli-Venezia Giulia: Fusine in Valromana VII, Tarvisio VII; Emilia: Foresta Campigna IX, Modena IX, Monzuno VIII; Toscana: Campi Bisenzio VI, Tavarnuzze VI; Abruzzo e Molise: Avezzano VII.
- Ulopa reticulata* F. - Liguria: M. Penna IX; Toscana: Firenze Casignano VII.
- Ulopa trivialis* Germ. - Trentino-Alto Adige: Garniga VIII; Emilia: Portonovo IX; Toscana: Firenze VII.
- Ledra aurita* L. - Lombardia: Brescia V; Friuli-Venezia Giulia: Pozzuolo del Friuli XI, Udine X; Emilia: Cervia VIII, Piacenza X; Toscana: Firenze IX, X, Pistoia X; Puglia: Gargano VI; Sardegna: Tempio VI.
- Macrosteles alpinus* Zett. - Trentino-Alto Adige: Val Eores VIII; Veneto: M. Civetta VIII, Negrar X.
- Macrosteles cristatus* Rib. - Piemonte: Castellazzo Novarese VI; Lombardia: Bergamo VII, VIII; Veneto: Padova VII.
- Macrosteles frontalis* Scott - Trentino-Alto Adige: Bressanone VIII, Luson VII; Veneto: Chioggia V, Falcade VIII; Friuli-Venezia Giulia: Fusine in Valromana VII; Basilicata: Nova Siri VII.
- Macrosteles laevis* Rib. - Trentino-Alto Adige: Bressanone VIII, Rio di Pusteria VIII; Veneto: Padova VII; Emilia: Foresta Campigna VI; Puglia: Gioia del Colle V.
- Macrosteles maculosus* Then - Friuli-Venezia Giulia: Cave Predil VII, Lago Predil VII.
- Macrosteles quadripunctulatus* Kb. - Friuli-Venezia Giulia: Moggio Udinese VII; Campania: Vibonati V.
- Macrosteles salsolae* Put. - Veneto: Laguna S. Erasmo VI, Murano VI, Vignole VI.

- Macrosteles septemnotatus* Fall. - Toscana: Firenze VII.
- Macrosteles sexnotatus* Fall. - Lombardia: Bergamo VII; Toscana: Tavarnuzze VII.
- Macrosteles variatus* Fall. - Friuli-Venezia Giulia: Tarvisio VII.
- Macrosteles viridigriseus* Edw. - Piemonte: Castellazzo Novarese VI, VIII; Veneto: Chioggia V; Toscana: Firenze Certosa IX, Rovezzano VII.
- Sagatus punctifrons* Fall. - Friuli-Venezia Giulia: Lago Fusine VII, Lago Predil VII, Valbruna VII; Abruzzo e Molise: Boiano VII, Parco Abruzzo Val Fondillo VII.
- Balclutha punctata* Thunb. - Trentino-Alto Adige: Mezzaselva VIII, Mules VII, Val Passiria VIII; Friuli-Venezia Giulia: Lago di Fusine VII, Riofreddo VII.
- Balclutha punctata* f. *confluens* Rey - Toscana: Firenze Casignano VII.
- Balclutha punctata* f. *impunctata* Rey - Trentino-Alto Adige: Val Genova VII; Friuli-Venezia Giulia: Rifugio Nordio VII, Tarvisio VII; Emilia: Foresta Campigna IX; Basilicata: Nova Siri V, Policoro VI.
- Balclutha saltuella* Kb. - Lombardia: Monvalle VIII; Veneto: Padova VIII; Toscana: Firenze VIII.
- Doratulina instabilis* Rib. - Basilicata: Nova Siri VII.
- Aconurella prolixa* Leth. - Trentino-Alto Adige: Bressanone VIII; Friuli-Venezia Giulia: Interneppo VII; Basilicata: Metaponto V, Nova Siri IX.
- Laburrus geniculatus* Rib. - Piemonte: St. Nicolas VII.
- Laburrus quadratus* Forel - Piemonte: Limone Piemonte VIII; Friuli-Venezia Giulia: Paludi Lisert VII; Basilicata: F. Ofanto VIII, Nova Siri VII; Calabria: Acri VIII, M. Scuro VIII, M. Volpintesta VIII.
- Laburrus quadratus* f. *atrata* Rib. - Basilicata: Nova Siri VII.
- Laburrus quadratus* f. *deleta* Rib. - Basilicata: Nova Siri VII.
- Euscelis bilobatus* Wagn. - Campania: Alfano V.

Euscelis distinguendus Kb. - Sicilia: Catania VIII.

Euscelis lineolatus Brullé - Trentino-Alto Adige: Pinzolo VII; Emilia: Piacenza VIII; Toscana: Bosco Teso VIII, Donnini III, Firenze VI, Firenze Certosa III, Pomino IV, Sesto Fiorentino III, Tavarnuzze IV; Abruzzo e Molise: Fucino VII, Boiano VII; Campania: Auduni VII, Capriglia Irpina VI, Castellabate V, Castello d'Alife VII, Centola V, Cuccaro Vetere V, Montano Antilia V, Palinuro V, Torre Orsaia V, Vibonati V, S. Gregorio Matese VII; Basilicata: Andriace VI; Sicilia: F. Ciane IV, Lentini IV.

Euscelis obsoletus Kb. - Trentino-Alto Adige: Bressanone VIII, Lavarone VIII, Luson VII, Val Funes VIII; Campania: Lago Matese VII, Letino VII; Sicilia: Lentini IX.

Euscelis venosus Kb. - Trentino-Alto Adige: Val Rendena VIII.

Euscelidius variegatus Kb. - Veneto: Padova VI, X; Toscana: Caldine IV, Firenze Certosa III, Donnini III; Umbria: Cascia VIII; Basilicata: Metaponto V, M. Vulture VII, Nova Siri VII, Policoro VI.

Streptanus josiffovi Dlab. - Emilia: Castelvetro VIII; Toscana: Tavarnuzze V; Puglia: Gioia del Colle V; Basilicata: Andriace V, Potenza VI.

Streptanus sordidus Zett. - Emilia: Portonovo VIII; Puglia: Gioia del Colle V; Basilicata: Metaponto V, Rotondella VI, Potenza VI.

Athysanus argentatus F. - Calabria: Silvana Mansio VIII.

Artianus manderstjernai Kb. - *Lazio: Fiuggi VII, Altopiano Arcinazzo VII; Campania: Lago Matese VII, S. Gregorio Matese VII.

Macustus grisescens Zett. - Toscana: Pescia V.

Thamnotettix confinis Zett. - Piemonte: Lillaz VII, Frassinney VII; Trentino-Alto Adige: Plose IX; Friuli-Venezia Giulia: M. Prisnig VII, Fusine in Valromana VII, Rifugio Nordio VII, Lago Predil VII, Tarvisio VII; Emilia: Portonovo V; Toscana: Campi Bisenzio V, Tavarnuzze VI, VIII.

- Thamnotettix exemptus* Löw - Emilia: Foresta Campigna VII.
- Thamnotettix zelleri* Kb. - Campania: Alfano V, Casalbuono V, Capriglia Irpina VII, Castellabate V, Palinuro V; Basilicata: Andriace V, Matera VI, Metaponto V, Bosco di Picciano VI.
- Thamnotettix dilutior* Kb. - Friuli-Venezia Giulia: Doberdò del Lago VII; I. Elba: Poggio Terme VI; Abruzzo e Molise: Bosco Redole VII, Guardiaregia S. Nicola VII; Campania: Castello d'Alife VII, Lago Matese VII, Montano Antilia V, Pattano V, Sanza V, Vibonati V, Tortorella V.
- Thamnotettix dilutior* f. *erythrostickta* Leth. - Lombardia: Besozzo VIII; Trentino-Alto Adige: Pederù VIII; Emilia: Grizzana VI; Campania: Sanza V.
- Rhopalopyx elongatus* Wagn. - Friuli-Venezia Giulia: Udine IX; Puglia: Gioia del Colle V; Basilicata: Irina VI, Bosco di Picciano VI, Potenza VI; Sardegna: Porto Torres IX.
- Rhopalopyx vitripennis* Fl. - Toscana: Tavarnuzze VI.
- Mocydia crocea* H.S. - Friuli-Venezia Giulia: Doberdò del Lago VII, Sedegliano IX; Campania: S. Gregorio Matese VII.
- Exitianus capicola* Stal - Campania: Rutino Scalo V, Scafati VIII, X; Basilicata: Nova Siri VII, IX, Policoro VI, VIII, Basile VI.
- Paramesodes lucaniae* Dlab. - Basilicata: Nova Siri VII, VIII.
- Anoplotettix fuscovenosus* Ferr. - Abruzzo e Molise: Rifugio Campitello VII, Roccamondolfi VII; Campania: Castellabate V, Lago Matese VII, Palinuro V, Scario V, Vibonati V; Basilicata: Andriace VI, Bosco di Picciano VI, Monticchio VI, Policoro VI.
- Anoplotettix fuscovenosus* f. *inornata* Horv. - Trentino Alto Adige: Riva Garda VII.
- Cicadula divaricata* Rib. - Trentino-Alto Adige: Riva del Garda VII; Sardegna: Alghero VII.
- Cicadula divaricata* f. *pallidifrons* Rib. - Sardegna: Alghero VII.

- Cicadula frontalis* H.S. - Calabria: M. Volpintesta VIII, Silvana Mansio VIII.
- Cicadula persimilis* Edw. - Piemonte: Sarre VII; Trentino-Alto Adige: Valsugana VIII; Friuli-Venezia Giulia: Tarvisio VII; Abruzzo e Molise: Parco Nazionale Camosciara VII, VIII.
- Cicadula placida* f. *inornata* Rib. - Piemonte: Castellazzo Novarese VII.
- Cicadula quadrinotata* F. - Lombardia: Monvalle VIII; Trentino-Alto Adige: Braies VIII, Faedo IX, Lavarone VIII, Naz VIII.
- Limotettix striola* Fall. - Trentino-Alto Adige: Naz VIII.
- Hardya melanopsis* Hardy - Trentino-Alto Adige: Bressanone VIII.
- Hardya signifer* Then - Trentino-Alto Adige: Spinga VII.
- Hardya tenuis* Germ. - Trentino-Alto Adige: Fortezza VIII; Abruzzo e Molise: Rifugio Campitello VII; Basilicata: Nova Siri VII.
- Hesium biguttatum* Fall. - Piemonte: Lillaz VII; Lombardia: Sottochiesa VIII; Trentino-Alto Adige: Val Genova VIII; Friuli-Venezia Giulia: Cave Predil VII, Tarvisio VII; Lazio: Terminillo VII, VIII.
- Pithyotettix abietinus* Fall. - Trentino-Alto Adige: Val Genova VII; Veneto: Asiago VII; Friuli-Venezia Giulia: Lago Fusine VII, Valbruna VII.
- Speudotettix subfuscus* Fall. - Piemonte: Cogne VII; Friuli-Venezia Giulia: Amaro IV, Lago Predil VII, Rifugio Nordio VII, Tarvisio VII, Valbruna VII.
- Perotettix pictus* Leth. - Veneto: Cordevole VII.
- Circulifer fenestratus* H.S. - Friuli-Venezia Giulia: Monfalcone VII, Paludi Lisert VII; I. Elba: Poggio Terme VI; Lazio: Rieti VIII; Abruzzo e Molise: Pescara X; Campania: Castello d'Alife VII, Centola V, Scario V, Viwonati V; Basilicata: Nova Siri VII, IX.

- Circulifer fenestratus* f. *fasciata* Ferr. - Basilicata: Nova Siri VII.
- Circulifer guttulatus* Kb. - Lazio: Fregene V; Abruzzo e Molise: Pescara X; Basilicata: Lago Sirino VII, Nova Siri IX, Vulture VIII.
- Circulifer guttulatus* f. *laeta* Rib. - Basilicata: Nova Siri IX.
- Circulifer haematoceps* M.R. - Basilicata: Nova Siri IX.
- Circulifer opacipennis* Leth. - Puglia: Ugento VII.
- Opsiis stactogalus* Fieb. - Veneto: Chioggia VIII, Verona VII; Marche: Fano V, Pesaro VII; Campania: Paestum V, Rutino Scalo V; Basilicata: Irsina VI.
- Stictocoris lineatus* F. - Friuli-Venezia Giulia: Fusine in Valromana VII, Rifugio Nordio VII; Abruzzo e Molise: Rifugio Campitello VII.
- Tetartostylus pellucidus* Mel. - Friuli-Venezia Giulia: Interneppo VII.
- Goniagnathus brevis* H.S. - Trentino-Alto Adige: Bolzano VII; Friuli-Venezia Giulia: Doberdò del Lago VII; Marche: Ascoli Piceno Colle S. Marco VI; Campania: Cuccaro Vetere V, Montano Antilia V, Pattano V, S. Gregorio Matese VII, Tortorella V.
- Goniagnathus guttulinervis* Kb. - Puglia: Castro VIII; Basilicata: Policoro VI, Nova Siri VII; Sicilia: Lentini IX.
- Rhytistylus proceps* Kb. - Friuli-Venezia Giulia: Doberdò del Lago VII; Abruzzo e Molise: Rifugio Campitello VII.
- Phlepsiis spinulosus* Wagn. - Veneto: Teolo VII; Abruzzo e Molise: Assergi VII, Bosco Redole VII; Campania: Agropoli V, Rutino Scalo V; Basilicata: Nova Siri IX.
- Graphocraerus ventralis* Fall. - Piemonte: Frassinney VII, Gran S. Bernardo VII, Valsavaranche VII, Vieyes VII; Trentino-Alto Adige: Val Funes VIII; Friuli-Venezia Giulia: Cave Predil VII; Emilia: Bologna V; Marche: Ascoli Piceno Colle S. Marco VI; Abruzzo e Molise: Parco Nazionale Camosciara VII, Val Fondillo VII, Rifugio Campitello VII, Roccamandolfi VII; Basilicata: Tolve VI.

Paramesus nervosus Fall. - Veneto: Venezia VI; Basilicata: Nova Siri V, VII.

Paramesus paludosus Rib. - Veneto: Laguna Val Dogà VI.

Allygus maculatus Rib. - Basilicata: Rivello VII.

Allygus mixtus F. - Campania: Agropoli VII.

Allygus modestus Scott - Lombardia: Varese VII; Toscana: Firenze VI, VII, Tavarnuzze VI; Abruzzo e Molise: Avezzano VII, Fucino VII; Campania: Acquavena V, Agropoli V, Alfano V, Castello d'Alife V, Centola V, Letino V, Palinuro V, Scario V; Puglia: Gioia del Colle V, Peschici V; Basilicata: Policoro VI.

Allygus provincialis Ferr. - Trentino-Alto Adige: Bressanone VIII; Friuli-Venezia Giulia: Tarvisio VII; Lazio: Terminillo VII, Sardegna: Olmedo VII.

Allygidius abbreviatus Leth. - Piemonte: Epinel VII, Gran S. Bernardo VII; Trentino-Alto Adige: Fortezza VIII, Rio di Pusteria VIII, Varna VIII; Veneto: Negrar VII, Teolo VII; Friuli-Venezia Giulia: Colle Medea V; Emilia: Bologna VIII, Monzuno VIII; Toscana: Bosco Teso VII, Chianciano VIII, Palazzolo V, Vallombrosa VIII, Tavarnuzze VIII, IX; Marche: Fano VI; Abruzzo e Molise: Avezzano VII, Maiella VIII, Pescasseroli VII, Rifugio Campitello VII; Campania: Matese Miralago VII; Basilicata: Lagonegro VII, Nova Siri V.

Allygidius atomarius F. - Veneto: Arquà Petrarca VI, Campodarsego VI; Emilia: Bologna VII; Toscana: Campi Bisenzio V, Tavarnuzze V, VI, VII; Abruzzo e Molise: Roccamandolfi VII; Campania: Letino VII, S. Gregorio Matese VII, Mercato S. Severino V; Basilicata: Lagonegro VII, Nova Siri VI.

Allygidius commutatus Scott - Lombardia: Sottochiesa VIII; Trentino-Alto Adige: Rovereto VI.

Allygidius detectus Rib. - Emilia: Foresta Campigna IX.

Allygidius furcatus Ferr. - Lombardia: Monvalle VII; Friuli-Venezia Giulia: Doberdò del Lago VII, Sedegliano VIII; Emilia: Portonovo VIII; Toscana: Firenze IX, Ta-

- varnuzze IV, V; Abruzzo e Molise: Avezzano VII, Boiano VII, Bosco Redole VII, Fucino VII; Campania: S. Gregorio Matese VII; Basilicata: Nova Siri VII.
- Paralimnus phragmitis* Boh. - Veneto: Chioggia VII, Laguna S. Giuliano VIII; Basilicata: Nova Siri V.
- Metalimnus formosus* Boh. - Trentino Alto Adige: Levico VII.
- Platymetopius guttatus* Fieb. - Toscana: Bosco Teso VIII; Basilicata: Lagonegro VII, Vulture VIII.
- Platymetopius henribauti* Dlab. - Marche: Cagli X; Umbria: Bivio Pietralunga IX; Campania: Acquavena V, Torre Orsaia V; Puglia: Foresta Umbra VII; Calabria: Acri VIII, Gambarie IX, Lago Arvo IX, M. Scuro VIII, Piani Aspromonte IX, Silvana Mansio VIII.
- Platymetopius major* Kb. - Piemonte: Tortona IX; Friuli-Venezia Giulia: Monfalcone VII; Emilia: Portonovo VIII; Toscana: Tavarnuzze IX.
- Platymetopius rostratus* H.S. - Piemonte: Lillaz VII; Veneto: Arquà Petrarca VII; Toscana: S. Vincenzo VIII, IX; Marche: Acqualagna X, Cagli X, Urbino X; Abruzzo e Molise: Lettomanoppello X.
- Purpuranus rubrostriatus* Horv. - Lazio: Fregene V; Basilicata: Nova Siri VII, IX.
- Psammotettix adriaticus adriaticus* Wagn. - Veneto: Jesolo VI; Puglia: I.S. Foca VIII.
- Psammotettix alienus* Dahlb. - Campania: Paestum V, Rutino Scalo V, Sanza V; Sicilia: Etna IV, Lentini IV.
- Psammotettix cephalotes* H.S. - Piemonte: Chevrère VII, Epinel VII, Frassinè VII, Valgrisanche VII; Veneto: Asiago VII, Chioggia VII, Verona Campofontana VI; Friuli-Venezia Giulia: Cave Predil VII, Fusine in Valromana VII, Passo Predil VII, Remanzacco VIII, Tarvisio VII, Valbruna VII; Abruzzo e Molise: Poggio Cancelli VI, Rifugio Campitello VII.
- Psammotettix confinis* Dahlb. - Piemonte: Castellazzo Novarese VI; Friuli-Venezia Giulia: Remanzacco VIII, Se-

degliano IX; Abruzzo e Molise: Boiano VII, Bosco Redole VII, Parco Nazionale Camosciara VII, Val Fondillo VII, Rifugio Campitello VII; Campania: Acquavena V, Casalbueno V, Casaletto Spartano V, Centola V, Lago Matese VII, Letino VII, Montano Antilia V, Rutino Scalo V, S. Lupo V, Scario V, Torre Orsaia V, Vibonati V.

Psammotettix erraticus Linn. - Emilia: Foresta Campigna VII.

Psammotettix helvolus Kb. - Trentino-Alto Adige: Plose IX.

Psammotettix notatus f. *diluta* Rib. - Trentino-Alto Adige: Plose IX; Abruzzo e Molise: Lettomanoppello X.

Psammotettix provincialis Rib. - Abruzzo e Molise: Pescara VII; Campania: Castellabate V, Paestum V, Palinuro V, Rutino Scalo V, S. Severino V, Scafati VII, VIII, Vibonati V; Sicilia: F. Ciane IV, Lentini IV.

Deltocephalus pulicaris Fall. - Piemonte: Castellazzo Novarese VII, Tortona IX; Lombardia: Pavia IX, Val Taleggio VIII; Trentino-Alto Adige: Garniga VII, Lavarone VIII, M. Bondone IX, Naz VIII, Pederù VIII, Plose IX, Val Genova VII, VIII, Val Martello IX; Veneto: Asiago VII, VIII, Frassenè VII, M. Civetta VIII, Padova VII; Friuli-Venezia Giulia: Cave Predil VII, Fusine in Valromana VII, Lago Fusine VII, Sedegliano IX, Tarvisio VII; Emilia: Foresta Campigna IX; Campania: Lago Matese VII.

Deltocephalus coronifer Marsh. - Piemonte: Castellazzo Novarese VI; Lombardia: Monvalle VIII; Friuli-Venezia Giulia: Sedegliano VIII.

Deltocephalus horvathi Then - Lombardia: Monvalle VIII; Veneto: Padova VII.

Deltocephalus schmidtgeni Wagn. - Veneto: Laguna Campalto VII; Campania: Palinuro V, Torre Orsaia V, Vibonati V; Basilicata: Metaponto V, Nova Siri V.

Jassargus bisubulatus Then - Trentino-Alto Adige: Rifugio Bedole VII; Abruzzo e Molise: Boiano VII, Bosco Redole VII; Campania: Montano Antilia V, Sanza V, Tortorella V.

- Jassargus latinus* Wagn. - Friuli-Venezia Giulia: Passo Tanamea VIII.
- Jassargus obtusivalvis* Kb. - Trentino-Alto Adige: M. Baldo V; Friuli-Venezia Giulia: Amaro IV, Colle Medea V, Doberdò del Lago VII, Fusine in Valromana VII, Interneppo VII, Monfalcone VII, Paludi Lisert VII, Venzona X.
- Jassargus cebennicus* Rib. - Friuli-Venezia Giulia: Fusine in Valromana VII.
- Jassargus allobrogicus* Rib. - Trentino-Alto Adige: Plose IX.
- Jassargus sursumflexum* Then - Friuli-Venezia Giulia: Fusine in Valromana VII, Interneppo VII; Toscana: Tavarnuzze VI; Abruzzo e Molise: Parco Nazionale Camosciara VII; Basilicata: Lago Sirino VII.
- Pseudolausus laciniatus* Then - Piemonte: St. Nicolas VII.
- Errastunus ocellaris* Fall. - Trentino-Alto Adige: Cadipietra VIII; Friuli-Venezia Giulia: M. Prisnig VII; Emilia: Portonovo VII, VIII.
- Turrutus socialis* Rib. - Trentino-Alto Adige: Bressanone VIII, Luson VII; Friuli-Venezia Giulia: Udine IX; Emilia: Portonovo VIII.
- Adarrus exornatus* Rib. - Lombardia: Besozzo VIII, Monvalle VIII; Trentino-Alto Adige: Bressanone VIII, Pederù VIII; Friuli-Venezia Giulia: Fusine in Valromana VII, Passo Predil VII, Tarvisio VII; Emilia: Foresta Campigna IX; Abruzzo e Molise: Parco Nazionale Camosciara VII; Campania: Cuccaro Vetere V, Montano Antilia V, Pattano V, Sanza V.
- Adarrus multinotatus* Boh. - Veneto: Asiago VII, Padova VII; Friuli-Venezia Giulia: Amaro IV, Doberdò del Lago VII, Lago di Fusine VII, Tarvisio VII, Sedegliano VIII, Tavagnacco VIII, Paludi Lisert VII, Valbruna VII; Emilia: Foresta Campigna VII, Portonovo VIII; Toscana: Firenze VII, Impruneta IX, Rovezzano VII, Tavarnuzze V; Campania: Lago Matese VII.
- Adarrus reductus* Mel. - Puglia: Peschici VII, Presicce VII.
- Adarrus bellevoeyi* Put. - Liguria: M. Penna IX.

Arocephalus longiceps Kb. - Emilia: Foresta Campigna VI, IX; Campania: Montano Antilia V; Basilicata: Potenza VI.

Diplocolenus calceolatus f. *bohemani* Zett. - Trentino-Alto Adige: Lago di Ledro VII, Pederù VIII, M. Bondone VIII; Friuli-Venezia Giulia: Cave Predil VII, Fusine in Valromana VII, Lago Predil VII, Passo Predil VII, Tarvisio VII, Valbruna VII.

Diplocolenus fraunfeldi Fieb. - Piemonte: Rhêmes Notre Dame VII, St. Nicolas VII.

Diplocolenus nigrifrons Kb. - Piemonte: Cogne VII; Trentino-Alto Adige: Folgaria VIII, Lavarone VIII, Mezzaselva VIII, Pellizzano VIII, Spinga VII.

Diplocolenus abdominalis abdominalis F. - Piemonte: Antey St. André VII, Cogne VII, Epinel VII, Frassinè VII, Lillaz VII, Piani di Breuil VII, Rhême Notre Dame VII, Valnontey VII, Valsavaranche VII, Vieyes VII; Trentino-Alto Adige: Mezzaselva VIII, Nova Levante VIII, Pinzolo VII, Val di Funes VIII, Val di Vizze VIII, Val Genova VII; Veneto: Asiago VII, Auronzo VII, Frassenè VII; Friuli-Venezia Giulia: Camporosso in Valcanale VII, Lago Fusine VII, Lago Predil VII, Passo Predil VII, Rifugio Nordio VII, Tarvisio VII, Valbruna VII; Emilia: Cervia VII.

Diplocolenus abdominalis monticola Linnav. - Emilia: Foresta Campigna VI, VII; Campania: Lago Matese VII, VIII, S. Gregorio Matese VII.

Diplocolenus nigricans Kb. - Trentino-Alto Adige: Folgaria VIII, Lavarone VIII.

Arthaldeus striifrons Kb. - Piemonte: Castellazzo Novarese VI, Nibbia VI; Veneto: Laguna VI; Toscana: Tavar-nuzze VI, VII; Abruzzo e Molise: Bosco Redole VII.

Sorhoanus assimilis Fall. - Friuli-Venezia Giulia: Fusine in Valromana VII, Tarvisio VII.

Sorhoanus medius M.R. - Piemonte: Gran S. Bernardo VII.

Mocuellus collinus Boh. - Veneto: Chioggia VII, Laguna di Venezia VI, VII.

Phlogotettix cyclops M.R. - Piemonte: Limone Piemonte VIII;
Veneto: Padova VI.

Placotettix taeniatifrons Kb. - Toscana: Chianciano VIII, Fiesole V, Firenze Casignano VII, Galluzzo X; Lazio: Fregene VIII; Sicilia: Bosco della Ficuzza IX, Messina IX.

Synophropsis lauri Horv. - Veneto: Padova VIII.

Selenocephalus griseus F. - Piemonte: St. Nicolas; Friuli-Venezia Giulia: Doberdò del Lago VII, Paludi Lisert VII; Campania: Alfano V, Auduni VII, Castellabate V, Centola V, Lago Matese VII, Letino VII, S. Gregorio Matese VII, Sassinoro VII, Palinuro V, Vibonati V.

Selenocephalus pallidus Kb. - Friuli-Venezia Giulia: Monfalcone VII, Paludi Lisert VII.

Fieberiella flori Stal - Piemonte: Limone Piemonte VIII; Lombardia: Mantova V; Trentino-Alto Adige: Bressanone VIII; Emilia: Portonovo VIII; Toscana: Chianciano VIII, Firenze Certosa IX, M. Morello IX, Rovezzano VIII, Sesto Fiorentino X, Tavarnuzze V; Marche: Acqualagna IX, Cagli IX, Urbino X; Abruzzo e Molise: Tagliacozzo VII; Campania: Paestum V, Sapri S. Maria di Cordici V, Torre Orsaia V; *Puglia: Gargano IX; Basilicata: F. Ofanto VIII, Nova Siri VII; Sicilia: Messina IX.

Fieberiella salacia Dlab. - Puglia: Presicce VII.

Eupelix cuspidata F. - Friuli-Venezia Giulia: Moggio Udinese V; Marche: M. Ardizio X; Campania: Alfano V, Casaletto Spartano V, Castellabate V, Centola V, Montano Antilia V, Pattano V, Rutino Scalo V, S. Severino V, Sanza V; Basilicata: Bosco Montechiano VI, Nova Siri V, VII.

Eupelix cuspidata f. *depressa* F. - Marche: M. Ardizio X.

Eupelix cuspidata f. *producta* Germ. - Veneto: Laguna Vignole VI; Marche: Acqualagna X, M. Ardizio X; Campania: Casaletto Spartano V, S. Severino V, Vallo Scalo V; Basilicata: Andriace VI, Bosco di Picciano VI, Nova Siri V, VII, Policoro VI.

- Errhomenellus brachypterus* Fieb. - Emilia: Foresta Campigna IX.
- Strongylocephalus agrestis* Fall. - Trentino-Alto Adige: Cei VIII, Mezzacorona IX.
- Strongylocephalus livens* Zett. - Trentino-Alto Adige: Caldaro X.
- Aphrodes albifrons* L. - Trentino-Alto Adige: Caldaro IX; Emilia: Portonovo VIII; Toscana: S. Vincenzo VIII.
- Aphrodes albifrons* f. *apicalis* Sign. - Campania: Casaletto Spartano V, Vibonati V.
- Aphrodes albifrons* f. *arcuata* Kb. - Campania: Alfano V.
- Aphrodes albifrons* f. *dispar* Zett. - Campania: Alfano V, Casaletto Spartano V, Montano Antilia V, Pattano V, Vallo Scalo V, Vibonati V.
- Aphrodes albifrons* f. *subrustica* Fall. - Campania: Alfano V.
- Aphrodes bicinctus bicinctus* Schrk. - Friuli-Venezia Giulia: Castions VI, Fusine in Valromana VII, Cave Predil VII, Passo Tanamea VII, Tarvisio VII; Campania: Acquavena V, Casalbuono V, Centola V, Lago Matese VII, Letino VII, Paestum V, Pattano V, Rutino Scalo V, Scario V, Vibonati V.
- Aphrodes bicinctus bicinctus* f. *aestuarina* Edw. - Veneto: Pontevigodarzere VI; Friuli-Venezia Giulia: Tarvisio VII.
- Aphrodes bicinctus bicinctus* f. *obtusifrons* Kb. - Emilia: Portonovo IX; Marche: Fano VIII.
- Aphrodes bicinctus diminutus* Rib. - Abruzzo e Molise: Boiano VII.
- Aphrodes bifasciatus* L. - Piemonte: Courmayeur VI; Veneto: Verona VI; Friuli-Venezia Giulia: Lago Fusine VII, Passo Predil VII; Lazio: Roma VIII; Calabria: Ponte Calderaro VII.
- Aphrodes carinatus* Stal - Abruzzo e Molise: Rifugio Campitello VII; Campania: Agropoli V, Casaletto Spartano V, Centola V, S. Severino V, Scario V, Vibonati V.
- Aphrodes flavostriatus* Donovan. - Veneto: Asiago VII; Calabria: Lago Ampollino VI.
- Aphrodes histrionicus* F. - Campania: S. Severino V, Alfano V.

- Aphrodes nigrinus* Kb. - Piemonte: Frassinè VII, Valnontey VII, Vieyes VII; Trentino-Alto Adige: Ortisei VIII, Pederù VIII, Pinzolo VII, Nova Levante VIII, Bondone VIII; Friuli-Venezia Giulia: Cave Predil VII, Lago Funes VII, Passo Predil VII, Tarvisio VII, Valbruna VII; Emilia: Foresta Campigna IX; Lazio: M. Terminillo VII.
- Aphrodes nigrinus* f. *integra* Wagn. - Veneto: Asiago VII, Verona VII.
- Aphrodes serratulae* F. - Trentino-Alto Adige: Trento VI; Veneto: Mestre VII; *Friuli-Venezia Giulia: Trieste VII.
- Aphrodes trifasciatus* Fourcr. - Liguria: M. Penna IX; Trentino-Alto Adige: Folgaria VIII; Lazio: Terminillo VIII; Abruzzo e Molise: Gran Sasso VI.
- Chiasmus conspurcatus* Ferr. - Lombardia: Monvalle VIII; Trentino-Alto Adige: Levico VIII; Toscana: Rovezzano VIII; Campania: Scafati VIII; Basilicata: Nova Siri V, VII.
- Doratura homophila* Fl. - Lombardia: Sottochiesa VIII; Toscana: Chianciano VIII.
- Doratura impudica* Horv. - Piemonte: Lillaz VII, Limone Piemonte VIII, Valsavaranche VII; Friuli-Venezia Giulia: Udine IX; Emilia: Foresta Campigna IX; Basilicata: Nova Siri V.
- Doratura paludosa* Mel. - Lazio: Terminillo VIII; Abruzzo e Molise: Boiano VII, Forca Caruso VII, Rifugio Campitello VII; Campania: Castello d'Alife VII; Calabria: Capo Rizzuto V.
- Doratura stylata* Boh. - Piemonte: Tortona IX; Trentino-Alto Adige: Bressanone VIII, Fortezza VIII, Val di Funes VIII; Friuli-Venezia Giulia: Cave Predil VII, Lago Predil VII, Tarvisio VII; Toscana: Campi Bisenzio V, Tavaruzze VII; Abruzzo e Molise: Guardiaregia S. Nicola VII, Lago Matese VII, Parco Nazionale Camosciara VII, Val Fondillo VIII, Rifugio Campitello VII; Campania: Castello d'Alife VII; Basilicata: F. Ofanto VII.

Doratura veneta Dlab. - C a m p a n i a : Acquavena V, Alfano V, Casalbuono V, Castellabate V, Centola V, Cuccaro Vetere V, Casaletto Spartano V, Montano Antilia V, Paestum V, Palinuro V, Pattano V, Rutino Scalo V, S. Severino V, Sapri S.M. di Cordici V, Scario V, Torre Orsaia V.

Aglena ornata H.S. - B a s i l i c a t a : Nova Siri V.

Tettigella viridis L. - P i e m o n t e : Antey St. André VII, Castellazzo Novarese VI, Crescentino VIII, Limone Piemonte VIII, Oldenico VII, Tortona IX; L o m b a r d i a : Besozzo VIII, Monvalle VIII, Pavia VIII; T r e n t i n o - A l t o A d i g e : Appiano X, Folgaria VIII, Lavarone VIII; F r i u l i - V e n e z i a G i u l i a : Rifugio Nordio VII, Sedegliano VIII, Tarvisio VII, Valbruna VII; E m i l i a : Bologna VIII, Castrocaro VII, Foresta Campigna VI, IX, Molinella V, Monzuno VIII, Portonovo VII, S. Bonico X, Val Savena VIII, Zocca VIII; M a r c h e : Ascoli Piceno Colle S. Marco VI, M. Ardizio X, Pesaro VI, Urbino X; U m b r i a : Bivio Pietralunga IX; L a z i o : Torricella Sabina VIII; A b r u z z o e M o l i s e : Chieti VIII, Fucino VII, Parco Nazionale Camosciara VII, Val Fondillo VII, Pescara V, Teramo VII, Guardiaregia S. Nicola VII; C a m p a n i a : Alfano V, Casalbuono V, Lago Matese VII, Letino VII, Paestum V, Rutino Scalo V, Sassinoro V, Torre Orsaia V, Vibonati V; B a s i l i c a t a : Bosco Montechiano VI, F. Ofanto VII, Irsina VI, Metaponto V, Monticchio VIII, Nova Siri VII, IX, Lagonegro VII.

Tettigella viridis f. arundinis Germ. - P i e m o n t e : Castellazzo Novarese VI, Mergozzo VI; L o m b a r d i a : Monvalle VIII; V e n e t o : Cinto Euganeo IX; E m i l i a : Portonovo IX; T o s c a n a : Tavarnuzze VI; A b r u z z o e M o l i s e : Parco Nazionale Val Fondillo VII.

Tettigella viridis f. concolor Hpt. - V e n e t o : Pontevigodarzere VI.

Evacanthus acuminatus F. - P i e m o n t e : Antey St. André VII, Cogne VII, Frassinney VII, Limone Piemonte VIII; L o m b a r d i a : Mantova V, Sottochiesa VIII, Val Taleggio VIII; T r e n t i n o - A l t o A d i g e : Fortezza VIII, Luson VIII, Val di Vizze VII, Val Martello IX; F r i u l i - V e n e z i a G i u l i a : Laghi di Fusine VII, Tarvisio VII; E m i l i a : Foresta Campigna VI, Monzuno VIII, S. Felice sul Panaro VI;

T o s c a n a : Poggibonsi V; A b r u z z o e M o l i s e : Parco Nazionale Camosciara VII, Val Fondillo VII, Rifugio Campitello VII; C a m p a n i a : Letino VII, VIII, S. Gregorio Matese VII; B a s i l i c a t a : Policoro V; C a l a b r i a : Lago Arvo IX, M. Botte Donato VIII, M. Scuro VIII, M. Volpintesta VIII.

Evacanthus interruptus L. - P i e m o n t e : Antey St. André VII, Cogne VII, Frassinè VII, Limone Piemonte VIII; L i g u r i a : M. Penna IX; L o m b a r d i a : Val Taleggio VIII; T r e n t i n o - A l t o A d i g e : Bressanone VIII, Folgaria VIII, Luson VIII, Ortisei VIII, Pellizzano VIII, Val di Funes VIII, Val Genova VIII; F r i u l i - V e n e z i a G i u l i a : Fusine in Valromana VII, Ligosullo VI, Tarvisio VII; E m i l i a : Foresta Campigna VI, VII; A b r u z z o e M o l i s e : Parco Nazionale Camosciara VII, Val Fondillo VII, Rifugio Campitello VII.

Evacanthus interruptus f. *rubescens* Hpt. - * A b r u z z o e M o l i s e : Parco Nazionale Val Fondillo VII.

Evacanthus interruptus f. *xantha* Mel. - P i e m o n t e : Limone Piemonte VIII; T r e n t i n o - A l t o A d i g e : Luson VII.

Penthimia nigra Goeze - L o m b a r d i a : Mantova V; F r i u l i - V e n e z i a G i u l i a : Trieste V.

Penthimia nigra f. *castanea* Gmel. - P i e m o n t e : Ternavasso V; F r i u l i - V e n e z i a G i u l i a : Trieste VI.

Penthimia nigra f. *haemorrhoea* Schrk. - F r i u l i - V e n e z i a G i u l i a : Colle Medea V, Trieste V; E m i l i a : Bologna IV, V, VI.

Penthimia nigra f. *maculata* Mel. - V e n e t o : Verona VI; T o s c a n a : M. Morello V.

Penthimia nigra f. *maculipennis* Rib. - V e n e t o : Verona V.

Penthimia nigra f. *ruficollis* F. - T r e n t i n o - A l t o A d i g e : Rovereto V; V e n e t o : Verona V; T o s c a n a : Tavar-nuzze VI.

Idiocerus albicans Kb. - L o m b a r d i a : Monvalle VIII, B a s i l i c a t a : Policoro VI.

Idiocerus confusus Flor - T r e n t i n o - A l t o A d i g e : Val Lagarina VIII; C a m p a n i a : Lago Matese VII.

Idiocerus cupreus Kb. - B a s i l i c a t a : Nova Siri VII.

- Idiocerus fulgidus* F. - Lombardia: Monvalle VIII; Friuli-Venezia Giulia: M. Prasnig VII.
- Idiocerus herrichi* Kb. - Piemonte: Leini II; Lombardia: Monvalle VIII; Trentino-Alto Adige: Cengialto X; Emilia: Bologna V, XII.
- Idiocerus impressifrons* Kb. - Basilicata: Nova Siri IX.
- Idiocerus lituratus* Fall. - Piemonte: Oropa VIII; Lombardia: Monvalle VIII; Trentino-Alto Adige: Rovereto VIII; Toscana: Poggibonsi V, Tavarnuzze V; Abruzzo e Molise: Pescasseroli VII, Terminillo VIII.
- Idiocerus mesopyrrhus* Kb. - Emilia: Bologna VIII; Toscana: Chianciano VIII.
- Idiocerus mesopyrrhus* f. *variegata* Rib. - Basilicata: Nova Siri VII.
- Idiocerus notatus* F. - Piemonte: Limone Piemonte VIII; Abruzzo e Molise: Fucino VII, Guardiaregia VII, Parco Nazionale Camosciara VII, Val Fondillo VII.
- Idiocerus ocularis* M.R. - Abruzzo e Molise: Pescara VII; Campania: Pattano V, Sapri S.M. di Cordici V.
- Idiocerus populi* L. - Piemonte: Limone Piemonte VIII; Trentino-Alto Adige: Bressanone VIII, Fortezza VIII, Luson VIII, M. Bondone VIII, Varna VIII; Friuli-Venezia Giulia: Rifugio Nordio VII; Emilia: Monzuno VIII.
- Idiocerus pruni* Rib. - Trentino-Alto Adige: Bressanone VIII; Toscana: S. Vincenzo VII, Tavarnuzze V.
- Idiocerus rotundifrons* Kb. - Lombardia: Val Taleggio VIII; Veneto: Padova X, Torreglia X; *Lazio: Terminillo VIII; Abruzzo e Molise: Forca Caruso VII.
- Idiocerus rutilans* Kb. - Trentino-Alto Adige: Lago Andalo IX.
- Idiocerus stigmatalis* Lew. - Lombardia: Monvalle VIII; Abruzzo e Molise: Fucino VII, Parco Nazionale Camosciara VII, Val Fondillo VII.
- Idiocerus tremulae* Estlund - Lazio: Roma VII.

Idiocerus ustulatus M.R. - Trentino-Alto Adige: Varna VIII; Emilia: Bologna VIII; Toscana: Poggibonsi V, Rovezzano VIII, Tavarnuzze IV; Abruzzo e Molise: Boiano VII; Basilicata: Nova Siri VII.

Idiocerus varius Germ. - Abruzzo e Molise: Parco Nazionale Camosciara VII.

Idiocerus vittifrons Kb. - Emilia: Foresta Campigna VI.

Rhytidodus decimusquartus Schrk. - Piemonte: Torino VIII; Lombardia: Besozzo VIII, Monvalle VIII, Val Taleggio VIII; Trentino-Alto Adige: Naz VIII; Friuli-Venezia Giulia: Interneppo VII, Paludi Lisert VII; Emilia: Bologna III, VII, XII, Monzuno VIII, Zocca IX; Toscana: Firenze VII, Bosco Teso VIII, Chianciano VIII, S. Casciano X; Basilicata: Nova Siri VII, Policoro V.

Rhytidodus decimusquartus f. *fulva* Rey - Piemonte: Susa V; Lombardia: Besozzo V; Veneto: Cerea IX, Padova, I, II, III, X, Rovigo XII; Emilia: Bologna IX, XI; Sicilia: Bosco della Ficuzza IX.

Agallia consobrina Curt. - Campania: S. Gregorio Matese VII.

Anaceratagallia halophila Lindb. - Puglia: Otranto VII.

Anaceratagallia laevis laevis Rib. - I. Elba: Poggio Terme VI; Abruzzo e Molise: Lettomanoppello X, Pescara X; Campania: Agropoli V, Capriglia Irpina VI, Castellabate V, Rutino Scalo V, S. Severino V, Torre Orsaia V; Basilicata: Nova Siri VII, IX.

Anaceratagallia ribauti Oss. - Piemonte: Castellazzo Novarese VI; Trentino-Alto Adige: Bressanone VIII; Veneto: Laguna S. Giuliano VIII; Friuli-Venezia Giulia: Interneppo IX; Lazio: Roma VII; Basilicata: Nova Siri VII; Calabria: M. Scuro VIII, S. Giovanni in Fiore VIII.

Anaceratagallia venosa Fourcr. - Friuli-Venezia Giulia: Tolmezzo VIII; Abruzzo e Molise: Fucino VII; Basilicata: Nova Siri IX.

Dryodurgades dlabolai Wagn. - Emilia: Foresta Campigna VI.

- Dryodurgades similis* Wagn. - Piemonte: Valsavaranche VII, Vieyes VII; Trentino-Alto Adige: Bressanone VIII.
- Austroagallia sinuata sinuata* M.R. - Piemonte: St. Nicolas VII; Emilia: Bologna VIII, Grizzana V; Toscana: Carmignano VII, S. Vincenzo V, Sesto Fiorentino X, Tavarnuzze VI; I. Elba: Poggio Terme VI; Abruzzo e Molise: Fucino VII; Campania: Paestum V, Palinuro V; Basilicata: Metaponto V, Nova Siri V.
- Oncopsis alni* Schrk. - Piemonte: Cheneil VII; Trentino-Alto Adige: Luson VII, Val Genova VIII, Varna VIII; Veneto: Verona VII; Friuli-Venezia Giulia: Sedegliano VI.
- Oncopsis flavicollis* L. - Piemonte: Frassinney VII; Trentino-Alto Adige: Val Genova VI; Friuli-Venezia Giulia: Gorizia VII; Emilia: Foresta Campigna VI; Toscana: Bosco Teso VII; Puglia: Foresta Umbra V.
- Oncopsis subangulata* J. Shlb. - Piemonte: Lillaz VII, Valnontey VII; * Lombardia: Mantova VII; Trentino-Alto Adige: Val Genova VII; Emilia: Foresta Campigna VI.
- Macropsis albae* Wagn. - Piemonte: Limone Piemonte VIII.
- Macropsis cerea* Germ. - Trentino-Alto Adige: Val Lagarina VII; Abruzzo e Molise: Parco Nazionale Val Fondillo VIII; Campania: Lago Matese VII, Letino VII, S. Gregorio Matese VII.
- Macropsis fuscinerwis* Boh. - Basilicata: Nova Siri VII.
- Macropsis fuscula* Zett. - Piemonte: Valsavaranche VII; Veneto: Murano VI; Campania: Lago Matese VII, Letino VII, S. Gregorio Matese VII; Basilicata: Lago negro VII, Lago Sirino VII.
- Macropsis glandacea* Fieb. - Trentino-Alto Adige: Bressanone VII; Campania: S. Gregorio Matese VII.
- Macropsis graminea* F. - Veneto: Padova VI; Campania: Lago Matese VII, Letino VII.
- Macropsis graminea* f. *populi* Edw. - Lombardia: Val Taleggio VIII; Calabria: M. Pecoraro VI; Sardegna: Bunari VII.

- Macropsis impura* Boh. - Trentino-Alto Adige: Luson VII; Friuli-Venezia Giulia: Lago Fusine VII, Lago Predil VII.
- Macropsis infuscata* J. Shlb. - Piemonte: Frassinney VII, Limone Piemonte VIII; Friuli-Venezia Giulia: Tarvisio VII; Toscana: Monteriggioni IV, Poggibonsi V; Abruzzo e Molise: Parco Nazionale Camosciara VII.
- Macropsis marginata marginata* H.S. - Piemonte: Epinel VII, Frassinney VII, Lillaz VII; Friuli-Venezia Giulia: Lago di Fusine VII, Lago di Predil VII; Emilia: Foresta Campigna VII; Toscana: Firenze V, Poggibonsi V; Abruzzo e Molise: Boiano VII, Guardaregia S. Nicola VII, Parco Nazionale Val Fondillo VII; Campania: Casalbuono V, Letino VII.
- Macropsis marginata marginata* f. *latestriata* Strobl. - Piemonte: Epinel VII, Frassinney VII; Toscana: Poggibonsi V; Abruzzo e Molise: Parco Nazionale Val Fondillo VII; Campania: Casalbuono V.
- Macropsis marginata lucifer* Wagn. - Friuli-Venezia Giulia: Lago Fusine VII, Lago Predil VII.
- Macropsis marginata notatifrons* Rey - Friuli-Venezia Giulia: Lago Fusine VII, Lago Predil VII.
- Macropsis marginata ossiannilssoni* Wagn. - Piemonte: Epinel VII, Frassinney VII, Vieyes VII; Friuli-Venezia Giulia: Lago Predil VII.
- Macropsis planicollis* Thms. - Friuli-Venezia Giulia: Lago Fusine VII, Predil VII, Valbruna VII; Abruzzo e Molise: Parco Nazionale Camosciara VIII, Val Fondillo VIII; Campania: Letino VII; Calabria: M. Volpintesta VIII.
- Macropsis scutellata* Boh. - Trentino-Alto Adige: Caldaro X; Toscana: Pisa VII; Abruzzo e Molise: Parco Nazionale Val Fondillo VII; Campania: Rutino Scalo V; Calabria: M. Scuro VIII.
- Macropsis vestita* Rib. - Piemonte: Epinel VII, Frassinney VII.
- Macropsis virescens* F. - Trentino-Alto Adige: Val di Fiemme VI; * Calabria: M. Volpintesta VIII.

Macropsis viridinervis Wagn. - Piemonte: Epinel VII, Frassiney VII; Abruzzo e Molise: Guardiaregia S. Nicola VII, Parco Nazionale Val Fondillo VII; Campania: Casalbueno V, Letino VII, Rutino Scalo V, S. Gregorio Matese VII.

Macropsidius calaber Dlab. - Calabria: Mazzaccara VI.

Macropsidius dispar Fieb. - Basilicata: Andriace VI, F. Ofanto VIII, Nova Siri V; Calabria: Acri VIII, S. Giovanni in Fiore VIII.

Hephathus freyi Fieb. - Veneto: Chioggia VIII, Laguna Vignole VI; Campania: Lago Matese VII; Basilicata: Lago Sirino VII, Nova Siri VII; Calabria: Fuscaldo VI, Gerace IX, Mazzaccara VI, Ponte Calderaro VI, Roseto Capo Spulico IX; Sicilia: Lentini IX, Messina IX.

Hephathus nanus H.S. - Trentino-Alto Adige: Folgaria VIII; Veneto: Venezia VI; Emilia: Bologna VIII; Campania: Alfano V, Lago Matese VII, Rutino Scalo V, Vibonati V.

Jassus lanio L. - Piemonte: Gran S. Bernardo VII, Lillaz VII; Lombardia: Monvalle VIII; Trentino-Alto Adige: Val Lagarina VII; Veneto: Verona VII; Friuli-Venezia Giulia: Tarvisio VII; Toscana: Chianciano VIII; Sicilia: Bosco della Ficuzza IX.

Jassus lanio f. *brunnea* F. - Friuli-Venezia Giulia: Tarvisio VII.

Jassus scutellaris Fieb. - Toscana: Firenze VI; * Campania: S. Gregorio Matese VII.

Fam. TYPHLOCYBIDAE Kb.

Alebra albostriella Fall. - Emilia: Badi VII; Basilicata: Ponte Vonchia VI.

Alebra albostriella f. *discicollis* H.S. - Emilia: Badi VII; Toscana: Firenze VII.

Alebra wahlbergi Boh. - Campania: S. Gregorio Matese VII.

Notus italicus Wagn. - Calabria: M. Volpintesta VIII, Silvana Mansio VIII.

- Forcipata obtusa* Vid. - Trentino-Alto Adige: Trieste X.
- Liguropia juniperi* Leth. - Veneto: Padova VIII; Toscana: Firenze VI, Sesto Fiorentino X.
- Erythria aureola* Fall. - Trentino-Alto Adige: Bressanone VIII; * Veneto: Asiago VII; * Friuli-Venezia Giulia: Cave Predil VII, Interneppo VII.
- Erythria manderstjernai* Kb. - Piemonte: Cogne VII, Rhême Notre Dame VII, Valnontey VII; Trentino-Alto Adige: Lago Landro VIII, M. Paganella IX; Veneto: Falcade VIII.
- Erythridea ferrarii* Put. - Liguria: Chiavari VII, Colle di Melogno IX; Veneto: Asiago VII; Toscana: Bosco Teso VIII.
- Dikraneura mollicula* Boh. - Emilia: Foresta Campigna VII; Lazio: Terminillo IX.
- Dikraneura variata* Hardy - Emilia: Foresta Campigna VII; Campania: Montano Antilia V.
- Kybos rufescens* Mel. - Piemonte: Frassinney VII; Friuli-Venezia Giulia: Lago Predil VII, Passo Predil VII, Rifugio Nordio VII; Abruzzo e Molise: Avezzano VII.
- Kybos smaragdula* Fall. - Abruzzo e Molise: Parco Nazionale Val Fondillo VIII; Campania: Letino VII; Calabria: M. Pollino VII.
- Kybos virgator* Rib. - Veneto: Padova VII.
- Asymmetrasca decedens* Paoli - Veneto: Padova VII; Abruzzo e Molise: Pescara VII.
- Kyboasca vittata* Leth. - Piemonte: Frassinney VII; Friuli-Venezia Giulia: Monfalcone VII, Paludi Lisert VII.
- Chlorita paolii* Oss. - Abruzzo e Molise: Assergi VII; Basilicata: F. Ofanto VIII.
- Empoasca decipiens* Paoli - Trentino-Alto Adige: Bressanone VIII.
- Empoasca flavescens* F. - Emilia: Bologna VIII; Toscana: Firenze IX.
- Eupteroidea stellulata* Burm. - Trentino-Alto Adige: Ortisei VIII.

- Eupteryx atropunctata* Goeze - Piemonte: Frassinè VII; Trentino-Alto Adige: Mezzaselva VIII, Varna VIII; Friuli-Venezia Giulia: Sedegliano VIII; Emilia: Portonovo VIII; Toscana: Tavarnuzze VI.
- Eupteryx aurata* L. - Trentino-Alto Adige: Luson VII; Friuli-Venezia Giulia: Tarvisio VII; Toscana: Pescia V; Lazio: Terminillo VIII; Puglia: Gioia del Colle V.
- Eupteryx collina* Fl. - Emilia: Foresta Campigna IX.
- Eupteryx collina* f. *florida* Rib. - Trentino-Alto Adige: Mezzaselva VIII; I. Elba: Poggio Terme VI.
- Eupteryx cyclops* f. *mendax* Rib. - Toscana: Bosco Teso VIII.
- Eupteryx decemnotata* Rey - Toscana: Firenze VI.
- Eupteryx melissae* Curt. - Puglia: Massafra V.
- Eupteryx notata* Curt. - Piemonte: Frassinè VII; Trentino-Alto Adige: Mezzaselva VIII; Veneto: Laguna S. Giuliano VIII, Verona Canello VIII.
- Eupteryx ornata* Leth. - Emilia: Foresta Campigna VIII, IX.
- Eupteryx rostrata* Rib. - Abruzzo e Molise: Pescara X.
- Eupteryx urticae* F. - Trentino-Alto Adige: Rio di Pusteria VIII; * Veneto: Padova XI; Emilia: Foresta Campigna IX; Basilicata: Monticchio VIII.
- Eupteryx urticae* f. *conjuncta* Rey - Emilia: Foresta Campigna IX.
- Eupteryx urticae* f. *deficiens* Rib. - Lazio: Terminillo VIII.
- Eupteryx urticae* f. *haupti* Wagn. - * Veneto: Padova XI; Emilia: Foresta Campigna IX.
- Eupteryx vittata* L. - Veneto: Verona Canello VIII.
- Eupteryx zelleri* Kb. - Veneto: Jesolo VI, Laguna Vignole VII; Lazio: Terminillo VIII; Campania: Alfano V, Castellabate V, Cuccaro Vetere V, Montano Antilia V, Palinuro V, S. Severino V, Rutino Scalo V, Torre Orsaia V, Vallo Scalo V, Vibonati V; Sicilia: F. Ciane IV.
- Eupteryx zelleri* f. *decussata* Rib. - Emilia: Foresta Campigna VI, IX; Sicilia: Lentini IV.

- Eupteryx zelleri* f. *hipposideros* Horv. - Sardegna: Sassari VI.
- Zyginella pulchra* Löw - Emilia: Piumazzo VI.
- Fagocyba cruenta* H.S. - Calabria: Gambarie IX.
- Fagocyba douglasi* Edw. - Emilia: Foresta Campigna IX; Lazio: Terminillo VIII.
- Typhlocyba ficaria* Horv. - Veneto: Padova X.
- Edwardsiana geometrica* Schrk. - Trentino-Alto Adige: Luson VII, Val Martello IX.
- Edwardsiana platanicola* Vid. - Piemonte: Torino VI, IX, XII; Liguria: Genova VII, S. Remo IX, X; Lombardia: Goito VIII, IX, X, Milano VII; Friuli-Venezia Giulia: Gorizia: VII, Trieste VII; Emilia: Bologna: VII; Calabria: Crotone VII; Sicilia: Catania VII; Sardegna: Sassari VII.
- Ribautiana debilis* Dgl. - Emilia: Vignola VIII.
- Erythroneura erecta* Rib. - Veneto: Padova X.
- Erythroneura parvula* Boh. - Veneto: Conegliano V, XII, Padova X; Friuli-Venezia Giulia: Tarvisio VII.
- Erythroneura spathulata* Rib. - Toscana: Tavarnuzze IV.
- Erythroneura discolor* Horv. - Veneto: Padova X; Toscana: Firenze VIII.
- Erythroneura flammigera* Geoffr. - Trentino-Alto Adige: Bressanone VIII.
- Erythroneura rhamnocola* Horv. - Veneto: Vò IX.
- Zygina bisignata* M.R. - Toscana: Firenze VIII, X, XII.
- Zygina distinguenda* Kb. - Piemonte: Limone Piemonte VIII; Trentino-Alto Adige: Bressanone VIII; Veneto: Conegliano I, Padova VII.
- Zygina nivea* f. *punctula* M.R. - Toscana: Firenze VIII.
- Zygina pullula* Boh. - Friuli-Venezia Giulia: Tarvisio VII; Basilicata: Nova Siri IX.
- Zygina rhamni* Ferr. - Veneto: Padova X.
- Zygina rhamni* f. *manca* Rib. - Veneto: Padova X.

Zygina scutellaris H.S. - Veneto: Padova VIII, Negrar V; Emilia: Portonovo VIII; Toscana: Firenze III; Campania: Alfano V; Sardegna: Alghero VII.

Zygina tithidae Ferr. - Veneto: Padova IX, X.

Zygina tithidae f. *nudata* Rib. - Veneto: Padova IX.

RIASSUNTO

Nella presente nota vengono indicate le singole località ed il mese di raccolta di 403 specie e 92 forme di Rincoti Omotteri Auchenorrhynchi e precisamente 32 specie e 7 forme di Cixiidae, 2 specie di Tropiduchidae, 19 specie e 1 forma di Issidae, 51 specie di Delphacidae, 15 specie e 7 forme di Tettigometridae, 9 specie e 1 forma di Cicadidae, 4 specie e 3 forme di Cercopidae, 14 specie e 22 forme di Aphrodidae, 3 specie e 5 forme di Membracidae, 206 specie e 35 forme di Cicadellidae e 48 specie e 11 forme di Typhlocybidae.

Tali località, che non hanno fatto fino ad ora oggetto di pubblicazione, completano il catalogo da me compilato riguardante la parte dei Rincoti Omotteri Auchenorrhynchi della fauna italiana.

Sono pure indicate nuove regioni ed una specie nuova per l'Italia l'*Eurysa laetitia* Dlab.

SUMMARY

In this paper are listed all the localities and months of collection of 403 species and 92 forms of Rhynchota Homoptera Auchenorrhyncha: 32 species and 7 forms of Cixiidae, 2 species of Tropiduchidae, 19 species and one form of Issidae, 51 species of Delphacidae, 15 species and 7 forms of Tettigometridae, 9 species and 1 form of Cicadidae, 4 species and 3 forms of Cercopidae, 14 species and 22 forms of Aphrodidae, 3 species and 5 forms of Membracidae, 206 species and 35 forms of Cicadellidae and 48 species and 11 forms of Typhlocybidae.

Such localities, hitherto unpublished, are to be added to my catalogue of Rhynchota Homoptera Auchenorrhyncha belonging to the Italian fauna. New regions are quoted and a new species (*Eurysa laetitia* Dlab.) is reported from Italy for the first time.