

文章编号: 1000—369X(2004)04—240—03

我国茶树蜡蝉区系及其主要种类

张汉鹄

(安徽农业大学茶业系, 安徽 合肥 230036)

摘要: 我国茶树蜡蝉类害虫多达 20 余种, 多属于蛾蜡蝉科与广蜡蝉科, 包括一些危害较重的种类。

关键词: 茶树; 蜡蝉; 区系

中图分类号: S571.1; Q969.36

文献标识码: A

Fauna of Tea Fulgora and the Major Species in China

ZHANG Han-gu

(Department of Tea science, Anhui Agricultural University, Hefei 230036, China)

Abstract: There were more than 20 species of fulgora recorded in tea areas of China. They belonged to 6 families of Fulgoroidea. Most of them belonged to Flatidae and Ricaniidae, including several harmful species.

Key words: Tea plant, Fulgora, Fauna

蜡蝉属同翅目(Homoptera)头喙亚目(Auchenorrhyncha)蜡蝉总科(Fulgoroidea)昆虫。大都分布于热带与亚热带地区, 在我国大多分布于华南至秦岭以南, 与我国茶区分布基本吻合, 蜡蝉种类较多。

1 我国茶树蜡蝉种类及其地理分布

据采集考查, 我国危害茶树的蜡蝉多达 20 余种, 其中大都属于蛾蜡蝉科(Flatidae)和广翅蜡蝉科(Ricaniidae)的一些种类。其它有菱蜡蝉科(Cixiidae)、象蜡蝉科(Dictyopharidae)、扁蜡蝉科(Tropiduchidae)和瓢蜡蝉科(Issidae)的个别种类。常见的主要种类有: 碧蛾蜡蝉、褐缘蛾蜡蝉、白蛾蜡蝉、圆纹宽广蜡蝉、可可广翅蜡蝉等, 不同程度存在一定危害(表 1)。

2 常见茶树蜡蝉的识别检索


- 1) 头短而常宽于前胸, 前翅爪片脉上无粒突, 前缘横脉不分叉, 颜面长等于或大于宽, 唇基侧缘无脊线(广蜡蝉科 Ricaniidae) 4
- 头较狭, 前翅爪片脉上有粒突, 前缘横脉常分叉(蛾蜡蝉科 Flatidae) 2
- 2) 体长约 20 mm, 粉绿或黄白色, 前翅顶角近直角状, 臀角明显尖锐突出, 中后部有一白斑
..... 白蛾蜡蝉 *Lawana imitata* Melichar
体长 7 mm 左右, 绿至黄绿色, 前翅近长方形或桨状, 顶角较弧圆, 翅缘暗红 3
- 3) 前翅近长方形, 臀角近直角不尖突, 色多绿至碧绿, 翅脉及翅缘红褐色, 胸背纵纹淡褐色
..... 碧蛾蜡蝉 *Geisha distinctissima* Walker
前翅桨状, 臀角尖突, 多黄绿色, 外缘及后缘呈赭褐色宽带, 后缘近端部有一赭褐

- 色斑，胸背纵纹红褐至金黄色.....
...褐缘蛾蜡蝉 *Salurnis marginellus* Guerin
- 4) 前翅透明，周缘褐色，前缘褐带最宽且夹有黄褐色三角斑，中横带亦褐色.....5
前翅暗褐，不透明，或只有透明斑纹.....6
- 5) 前翅中横带中段绕成圆环.....眼纹疏广蜡蝉 *Euricania ocellus* (Walker)
前翅中横带较狭，不绕成环.....
....带纹疏广蜡蝉 *E. fascialis* Walker
- 6) 前翅无透明斑.....7
前翅有透明斑.....9
- 7) 前翅中部有二深色直横带，近外缘有一较宽色更深直横带，其内侧还有一很细褐横带.....褐带广翅蜡蝉 *R. taeniata* Stal
前翅无深色直横带.....8
- 8) 前翅前缘、外缘色暗，向中后渐淡，前缘近端部 1/3 处稍凹，并有一三角形至半圆形淡黄褐色斑.....
....柿广翅蜡蝉 *R. sublimbata* Jacoli
前翅前缘中外侧有一黄褐色斑纹，并被褐色横脉分成 2~3 小块，翅基前缘有 6~7 对黄褐色斜纹。外缘略呈波状，亚外缘线为黄褐色细纹，与外缘平行。顶角有一隆起圆斑，并有 1~3 个深色小点。翅面散生黄褐横纹.....
....可可广翅蜡蝉 *R. cacaonis* Chou et Lu
- 9) 前翅有内横带与外横带，暗色或透明.....10
前翅无内横带与外横带，只有透明斑.....11
- 10) 前翅二横带色暗隐约可见，前缘近端部 1/3 处有一近梯形淡黄褐微透明斑，中部有一近圆形透明斑并围以黑褐色宽边，外缘近臀角 1/3 处有一半透明斑，近顶角另有一半透明斑不接外缘.....眼斑宽广蜡蝉 *Pachazia discreta* Melicha
前翅二横带宽而透明，外横带中断，前段末端内弯。前缘近端部 2/5 处有一三角透明斑，近顶角有一黑褐色隆起眼斑。后翅暗褐，亦有二透明横带.....钩纹广翅蜡蝉 *R. simalan* Walker
- 11) 前翅视若 6 个透明斑，前缘近顶角 1/3 处有一三

角形大斑，近中部有一近圆形斑，其内侧有一暗褐小圆斑，外缘有一大二小透明斑，后者常散成多个小斑.....缘纹广翅蜡蝉 *R. marginalis* (Walker)

前翅视若 4 个透明斑。前缘近顶角 2/5 处有一半圆透明斑，其外下方有一较大不规则透明斑，内下方有一较小近圆形透明斑，前缘近顶角有一很小狭长透明斑，外缘有二较大透明斑。后翅中部有一小透明斑.....八点广翅蜡蝉 *R. speculum* (Worker)

附图：



1. 白蛾蜡蝉 *Lawana imitata* 2. 褐缘蛾蜡蝉 *Salurnis marginella*
3. 碧蛾蜡蝉 *Geisha distinctissima* 4. 可可广翅蜡蝉 *Ricania cacaonis* 5. 八点广翅蜡蝉 *R. speculum* 6. 缘纹广翅蜡蝉 *R. marginalis*
7. 柿广翅蜡蝉 *R. sublimbata* 8. 褐带广翅蜡蝉 *R. taeniata* 9. 钩纹广翅蜡蝉 *R. simulanus* 10. 眼纹疏广蜡蝉 *E. ocellus* 11. 带纹疏广蜡蝉 *Euricania fascialis* 12. 眼斑宽广蜡蝉 *P. discreta* (1~3 仿自周尧)

3 几种主要蜡蝉

蜡蝉多一年发生一代，蛾蜡蝉在华南可一年 2 代，多以卵在嫩梢内越冬，少数种则以成虫在茶丛间越冬（如白蛾蜡蝉）。春茶季越冬卵孵出若虫，刺吸危害芽梢，并分泌蜡丝、蜜

露污染芽叶。6、7月间成虫盛发，在丛间飞动活跃，刺吸危害夏秋茶芽梢，并刺裂枝梢皮层产卵造成危害甚至芽梢枯竭。

蜡蝉喜阴湿畏阳光，茶丛繁茂复盖度大以及遮阴郁闭的茶园最利其发生，海南胶茶间作茶园可可广翅蜡蝉发生远比一般茶园严重。碧蛾蜡蝉在一般长势茶园虫口呈稀密相间大小集团分布或聚集分布，调查中宜用“Z”字形或对角线取样（徐自伦，1986）。

针对蜡蝉发生特点，宜秋末、早春结合茶园修剪，剪除并清除越冬卵虫梢；加强茶园管理，除草疏枝，增进通风透光；成虫盛发期网捕；药剂防治必须在若虫盛孵后及时进行，并注重丛内中上部叶背喷施。

参考文献：

- [1] 张汉鹤，韩宝瑜. 中国茶树昆虫区系及其区域性发生[J]. 茶叶科学, 1999, 19(2): 81~86
- [2] 谭济才. 湖南省茶园蜡蝉种类调查研究初报[J]. 茶叶科学, 1995, 15(1): 33~37
- [3] 王基立. 茶树两种蜡蝉的鉴别[J]. 茶叶, 1979(4): 49~50
- [4] 徐自伦. 碧蛾蜡蝉若虫在茶园空间分布型和抽样技术研究[J]. 茶业通报, 1986(3): 21~25
- [5] 谢光镒. 茶蛾蜡蝉的危害与防治[J]. 蚕茶通讯, 1992(2): 27~28
- [6] 周尧，路进生，黄桔，等. 中国经济昆虫志（第36册）同翅目蜡蝉总科（M）. 北京，科学出版社, 1985
- [7] 张汉鹤，谭济才. 中国茶树害虫及其无公害治理（M）. 合肥，安徽科学技术出版社, 2004

表1 我国茶树蜡蝉种类及其地理分布

Table1 The species or tea fulgora and their geographical distribution in China

种名 Species	茶区分布																	
	台湾	福建	广东	广西	海南	云南	贵州	四川	湖南	江西	浙江	江苏	安徽	湖北	河南	陕西	甘肃	山东
蛾蜡蝉科 Flatidae																		
碧蛾蜡蝉 <i>Geisha distinctissima</i> Walker																		
白蛾蜡蝉 <i>Lawana imitata</i> Melichar																		
褐缘蛾蜡蝉 <i>Salurnis marginella</i> Guerin																		
钱涩蛾蜡蝉 <i>Seliza ferruginea</i> Walker																		
广翅蜡蝉科 Ricanidae																		
带纹疏广蜡蝉 <i>Euricania fascialis</i> Walker																		
眼纹疏广蜡蝉 <i>E.ocellus</i> Walker																		
白斑宽广蜡蝉 <i>Pochazia albomaculata</i> Uhler																		
眼斑宽广蜡蝉 <i>P.discreta</i> Melichar																		
圆纹宽广蜡蝉 <i>P.guttifera</i> Walker																		
胡椒宽广蜡蝉 <i>P.pipera</i> Distant																		
可可广翅蜡蝉 <i>Ricania cacaonis</i> Chou et Lu																		
缘纹广翅蜡蝉 <i>R.marjinalis</i> Walker																		
粉黛广翅蜡蝉 <i>R.pulverosa</i> Stal																		
钩纹广翅蜡蝉 <i>R.simulans</i> Walker																		
琥珀广翅蜡蝉 <i>Ricania sp</i>																		
八点广翅蜡蝉 <i>R.speculum</i> (Walker)																		
柿广翅蜡蝉 <i>R.sublimbata</i> Jacobi																		
褐带广翅蜡蝉 <i>R.taeniata</i> Stal																		

注：几种菱蜡蝉、象蜡蝉、扁蜡蝉、瓢蜡蝉略 Note: Several species of *Cixius*, *Dictyophara*, *Tropiduchidae*, *Issidae* were omitted.