

DELPHACODES AUDRASI n. sp.
(Homoptera, Araecopidae)

par H. RIBAUT.

ENTOM. LINNÉENNE LYONNAISE

55.523

S 38.430

Deux mâles macroptères récoltés par M. G. AUDRAS à Lent (Ain).

Espèce voisine de *D. paludicola* Lindb. 1937.

Longueur du corps 2,4 mm, jusqu'à l'extrémité des élytres 2,95 mm ; largeur aux épaules 0,75 mm. Vertex presque carré, dépassant à peine les yeux en avant, beaucoup moins que chez *D. paludicola*. Espacement des extrémités postérieures des carènes latérales du pronotum deux fois plus grand que la longueur de la carène médiane. Nervures des élytres avec des granules sétifères. Premier article des antennes comme chez *D. paludicola*.

Avant-corps noir, avec les carènes de la tête roussâtres et celles du pronotum grisâtres, ainsi que le bord postérieur étroitement. Elytres hyalins, avec les nervures et la lisière noirâtres ainsi que leurs granules ; ils portent deux grandes plages noires, dont l'une occupe entièrement le tiers apical du clavus et se prolonge le long de la suture clavo-coriale presque jusqu'à la base, l'autre couvre les trois cellules apicales internes et l'extrémité des trois cellules discoïdales internes. Pattes et antennes légèrement enfumées.

Dans une vue postérieure, l'ensemble des blocs génital et anal se montre très voisin de celui que présente *D. paludicola*, la seule diffé-




Fig. 1 à 4 : *Delphacodes audrasi* n. sp. — 1. Segment anal, vue postérieure. 2. *Id.* vue latérale droite. — 3. Styles, vue postérieure. — 4. Pénis, vue latérale droite (la face postérieure est à gauche).

Fig. 5 à 8 : *Delphacodes paludicola* Lindb. — 5. Segment anal, vue postérieure. 6. *Id.*, vue latérale droite. — 7. Styles, vue postérieure. — 8. Pénis, vue latérale droite (la face postérieure est à gauche). — D'après un individu de Rostock (Mecklenburg), ex. coll. H. A. KUNTZE.

rence notable résidant dans les cornes du segment anal qui sont un peu plus grêles chez *D. audrasi* (fig. 1 et 5). Dans une vue latérale de ce segment, la différence entre les deux espèces s'accroît (fig. 2 et 6). Par contre la forme du pénis est très différente (fig. 4 et 8). Par comparaison avec celui de *D. paludicola*, on remarque son extrémité simple, son profil latéral plus allongé et rectiligne, les fortes épines ornant la moitié distale, la limite basale du gonopore située tout près de l'extrémité.

Présenté à la Section Entomologique en sa séance du 10 Avril 1954.
